

C. grandiflora (H. grandiflorum All. Willd. β . *angustifolia*. γ . *integrifolia*. δ . *uniflora*. *Crepis grandiflora* Willd. suppl. saltem quam ego cultam vidi, specie ab hac non differt.

C. lapsanoides (H. lapsanoides Gouan Willd.)

C. pygmaea Linn. (H. prunellaefolium Willd.)

C. sibirica Linn. (H. sibiricum Willd.)

Ad *Crepidem* porro spectare videntur. *H. pinnatifidum* Willd. *glutinosa* L. *sonchifolium* MB. *bracteolatum* Smith, *foetidum* Willd. *ciliatum* Willd. *turbinatum* Lapeyr. quas vero nondum vidi.

III. *Crepidium*

(*Crepidis* spec. L. Willd. Spr.)

Fructif. Anthodium polyphyllum involucreatum. Receptaculum nudum. Pappus pilosus niveus caducus sessilis, aut nonnunquam disci stipitatus. Semina difformia, radii compresso-angulata.

Veget. Herbae annuae ramosissimae asperae, foliis runcinato-dentatis, pedunculis intumescensibus.

Divisio. I. *Sphaerotherca*: pappus sessilis. Huc spectat *Crepis Dioscoridis* Linn. a qua *C. heterosperma* Schrad. vix nisi caule scabro differt. II. *Crepibrachium*: pappus disci stipitatus. Huc pertinet *Crepis aspera* Linn. forte et *Chondrilla crepoides* Willd.?

IV. *Borkhausia* Boehm. Spr.

Kann auf dieselbe Weise wie *Crepidium* abgetheilt werden, indem bei mehreren Arten die Haarkrone durchaus gleichlang gestielt ist, *Cnenum*: e. g. *B. alpina*, oder indem die Haarkrone
der