

1. in summo monte Hedscha 9300' a. m. 3. oct. 1862.

(n. 334.)

Adest in coll. a. 1853 n. 163.

LVI. **Crepis L.**

128. C. Schultzii Hochst. in Schimp. pl. abyss. II. 861, A. Rich. I. c. 464. (sub Barkhausia.)

1. in declivibus ad fluvium Repp prope Gerra Abuna Tekla Haimanot 29. nov. 1863. (n. 1434.)

129. C. achyrophoroides Vatke.

caule basi foliato superne nudo ramoso angulato, ad angulos scaberulo, foliis oblongis, basalibus plerisque obtusiusculis, nunc caulinisque acuminatis sinuato-dentatis subpinnatifidis, basi late petiolatum attenuatis subsessilibus, utrinque margineque setulosis, caulinis 1—2 sessilibus cordato-sagittatis semiamplexicaulibus, capitulis longe pedicellatis solitariis, involuci squamis obtusis, exterioribus ovato-lanceolatis, extimis recurvis, interioribus oblongis medio canescensibus, lateribus viridulis tomentellis, quam flores subdupo brevioribus, achaeniis oblongis obtusangulis in rostrum sensim angustatis glabris, pappi setis barbellatis. 24.

1. in montibus ad Sanka Berr 7000' a. m. 8. oct. 1863. (n. 1223.)

Herba ad 12 dm. alta, habitu fere Achyrophori maculati; folia basalia ad 1,3 dm. longa, ad 5 cm. lata, capitulis quam in praecedente specie affini fere duplo majoribus.

C. abyssinica Schultz bip. Walp. rep. II. 697 ad Eucrepidem relata posset esse eadem; sed phrasis cl. auctoris nimis brevis.

130. C. carbonaria Schultz bip. in Schimp. pl. abyss. II. 1150 et 1383, A. Rich. I. c. 465 (sub Barkhausia).