

Hab. circa Metkovich prope veterem Naronam in agris. Fl. Octobri: v. v.

Obs. Differt ab *A. procera* W., cui similis, odore graveolente, canescentia, panicula crassiore, foliis multo magis divisis, laciniis multo brevioribus.

7. *Crepis adenantha* mihi.

*C. hirta*, caule simplici sulcato erecto, foliis lyrato-runcinatis, inferioribus petiolatis, laciniis sursum unidentatis, superioribus sessilibus, supremis lanceolato-linearibus integris; floribus laxe racemosis, apice corymbosis, pedunculis unifloris anthodiisque setoso-glandulosis. ☉

Hab. in montibus ditionis Ascriviensis. Fl. Junio. v. s.

II, *Auszug aus dem Bericht über eine Besteigung des ohnweit Bern sich erhebenden Stockhorn, im Juli 1827.*; von Hrn. M. J. Löhr, Candidaten der Pharmacie zu Coblenz. \*)

Dieser Fels erhebt sich 6760' über dem Meere, in der Gebirgskette südwärts des Simmenthals und besteht aus Kalkstein. —

Den 10. brach ich von Bern auf, und erreichte in 4 Stunden das Dorf Wattenwyll. Nahe bei dem Ort blühete in Hecken: *Tamus communis* et *Malva moschata* mit *Alcea*, dann auf Torfboden *Epipactis palustris*, *Schoenus caricinus*, *Carex teretiuscula*,

\*) Ein anderer Bericht von demselben Verfasser über eine botanische Reise durch das Berner-Oberland nach dem Sustenpafs u. s. w. wird bei der nun sehr vermehrten Anzahl unserer Blätter demnächst nachfolgen. Die Red.