

C. foliis lanceolato-runcinatis sessilibus laevibus, inferioribus dentatis. *Fl. dan.* 501. *Flor. suec.* 640. 705. *Dalib. parif.* 238. *Gmel. sib.* 2. p. 28. t. 11 et 12. *Reyg. ged.* 1. p. 194. n. 1. *Nect. in Act. pal.* 2. p. 464.* *Pollich. pal.* n. 751. *Leers herb.* n. 610, *Hoffm. germ.* 281. *Roth. germ.* I. 335. II. 252.

C. foliis radicalibus pinnatis, superne amplexicaulibus, pinnatis, hastatis. *Hall. helv.* n. 31.

C. murorum. *Neck. gallob.* p. 331.

Hieracium foliis radicalibus pinnato-dentatis, caulinis lanceolatis subdentulatis. *Fl. lapp.* 286. *Hort. cliff.* 387.

Hieracium luteum glabrum s. minus hirsutum. *I. B. Raj. angl.* 3. p. 165.

Hieracium, chondrillae folio hirsutum. *Bauh. pin.* 127. a *Tabern.*

Hieracium, chondrillae folio, glabrum. *Bauh. pin.* 127.

Hieracium II. *Tabern. hist.* 491. bene.

Hieracioides vulgatissima paene glabra annua, folio longo dentato. *Vaill. act.* 1718.

Cichorium pratense luteum laevius. *Bauh. pin.* 126.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 94.

Gemeinster Pippau. W.

Habitat in Europae aridis, tectis. ☉ (v. v.)

Planta vulgatissima, cinerascens-virens. Caulis angulato-sulcatus: Ramis longitudine caulis. Folia Radicalia *Taraxaci*; Caulina *Leont. autumnalis*: dentibus baseos erectis longioribus; Ramea integra, linearia, subsagittata marginibus revolutis. Flores nunquam mutant, facie *Lapsanae*. Styli antheris egressi sunt fusci singulari nota. Planta caeterum polymorpha. Calyx calyculatus, sulcatus, adpersus longitudinaliter pilis glutiniferis.

Pappus sessilis. *Leers l. c.*

* 23. CREPIS agrestis.

C. foliis radicalibus lanceolato-runcinatis, caulinis lanceolatis basi dentatis sagittatis, floribus corymbose-paniculatis, calycibus hirtis. W.

Crepis agrestis. *Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung.*

Acker-Pippau. W.

Habitat in agris aggeribus pratisque siccis Hungariae.

☉ (v. v.)

Planta spontanea a culta valde diversa. Spontanea sesquipedalis hispida, culta bipedalis et ultra fere glabra. Calyx in spontanea hirtus, in culta fere glaber, excluso exteriori. Flores minores quam in *C. tectorum*. W.

*24. CREPIS biennis.

C. foliis hispidis runcinato-pinnatifidis, summis sessilibus lanceolatis dentatis carina hispido-aculeatis, calycibus pubescentibus muricatis. W.

C. foliis runcinato-pinnatifidis scabris: basi superne dentatis, calycibus muricatis. *Fl. suec.* 2. p. 706. *Sort. ingr.* 125. *Pollich. pal. n.* 752. *Hoffm. germ.* 281. *Roth. germ. I.* 336. *II.* 254.

C. foliis subscabris, semipinnatis, pinna extrema maxima. *Hall: helv. n.* 30.

C. scanensis. *It. scan.* 171.

Hieracium maximum, chondrillae folio, asperum. *Bauh. pin.* 127. *prodr.* 64. *Raj. angl.* 3. p. 166.

Hieracium, erucæ folio, hirsutum. *Bauh. hist.* 2. p. 1025. *bene.*

Hieracioides altissima annua, chondrillae folio, flore utrinque luteo. *Vaill. act.* 1718.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 96.

Zweijähriger Pippau. W.

Habitat in Scaniae et Eüropae australioris pratis. ♂ (v. v.)

Calyx calyculatus, sulcatus, muricatus longitudinaliter aculeis mollibus. Folia omnia lyrato-pinnata, subtus hispida. Caulis angulatus, scaber, altitudine fere humana vel quadripedalis, fragilis.

*25. CREPIS scabra. W.

C. foliis runcinatis hispidis, caulinis sessilibus, floribus corymbosis, calycibus tomentosis exterioribus adpressis. W.

Rauhblättriger Pippau. W.

Habitat in Gallia. (v. f.)

Caulis striatus simplex pedalis pilis brevissimis parce obsitus. Folia radicalia valde hirta obovato-runcinata, laciniis obtusis subdentatis, petiolata bipollicaria; caulina lanceolata runcinata minus hispida sessilia, laciniis infimis parum elongatis; summa floralia *Linn. Sp. Pl. Tom. III. P. III.*