

Hieracium foliis lyrato-spatulatis, retrorsum dentatis; caulinis biauritis, amplexicaulibus; caule sulcato, apice viscofo, paucifloro.

An Hieracium *lyratum*? LINN.

CREPIS albida. *Tab. XII. fig. 1.*

Crepis foliis runcinato-dentatis incanis; squamis calicis simplicis membranaceis; flore albido. Habet GMEL. *II. Tab. VIII. fig. 1.*

ANDRYALA Nemäusensis. *Tab. XIX.*

Crepis *id.* GOÜ. *Illustr. 60.**

Andryala foliis lyrato-sinuatis; caule nudo, multifloro.

ANDRYALA Pontana. *Tab. VIII. fig. 2.*

Hypochaeris *id.* LINN. *Spec. 1140.*

Andryala caule folioso, unifloro.

* HYPOCHÆRIS uniflora.

Hypochaeris squamis calicinis lateribus timbratis; caule basi folioso, unifloro.

--Hierac. alpinum, foliis dentatis; flore magno?

C. BAUH. *Prod. 65.* HALL. *Enum. 760.*
tab. XXIV.

V. I.^e CLASSE.

I. LES CRUCIFORMES.

* MYAGRUM rugosum.

Myagrum foliis radicalibus, lyratis, obtusis; caulinis sagittatis, integerrimis; fructu rugoso, sphærico. Flos *albus*, *parvus*.

LEPIDIUM Iberis LINN.

Lepidium *graminifolium* ejusd.