

bescentes; folia omnia radicalia, numerosa, (5)7—15 cm lg. (cum petiolo) et 0.6—2 cm lt., lanceolata vel oblanceolata, apice acuta, irregulariter sinuato-dentata, dentibus anguste triangularibus acuminatis, petiolata, petiolis anguste alatis laminae aequilongis vel eis brevioribus. Calathidia in numero 1—2(3), erecta, plus minusve magna; involucri campanulatum, 12—16 mm lg. et 7—8(10) mm lt. (tempore florendi); involucri phylla extus pilis brevissimis glandulosis subbrunnescentibus et plus minusve longis setosis non glandulosis albido-flaveolis intermixtis dense tecta, margine tenuiter ciliata, exteriora in numero 8, ovato-lanceolata, oblongo-lanceolata, inaequilonga, interioribus 1.5—2-pla breviora, interiora in numero 12—16; oblongo-lanceolata, acuta, aequilonga, membranaceo-marginata (intima), facie interiore glabra; receptaculum glabrum; flores flavi, involucri fere duplo longiores; florum corolla 13—17 mm lg., ligula ad 2 mm lt., tubo 4.5—6 mm lg., pilis tenuibus flexuosis pubescente; rami styli flavi; achenia immatura uniformia, viridulo-flavescentia, 7.5—8 mm lg. et 0.5—0.7 mm lt., fusiformia, subangustata, costulata (ut videtur costulis in numero 20), laevia, glabra; pappus 7—7.5 mm lg., albus, non deciduus. Fl. VI.

Habitat in declivibus lapidosis calcareis Transcaucasiae meridionalis.

Typus: Transcaucasia meridionalis, respublica autonoma Nachiczewan, distr. Nachiczewan, prope fontem Alma-Bulag in monte Karagut (Karakusch), ca. 1900 m s. m., in declivibus lapidosis calcareis, 11 VI 1947, fl. et fr. immat., A. Grossheim, I. Iljinskaja et M. Kirpicznikov; in Herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS in Leningrad conservatur.

Affinitas. Nostra species nova *C. albiflorae* Babc. affinis est, sed caulibus altioribus, pilis plus minusve densis brevissimis glandulosis pallidis pubescentibus, foliis radicalibus majoribus irregulariter sinuato-dentatis, involucri phyllis extus pilis brevissimis glandulosis subbrunnescentibus et plus minusve longis setosis non glandulosis albido-flaveolis intermixtis dense tectis, involucri, floribus achenisque majoribus et pappo longiore differt.

122. *C. Alikeri* Tamamsch. sp. n. (sect. *Macropodes* Babc.).

Planta perennis, caudice brevi vulgo simplici, reliquiis fuscis foliorum veterum vestito; caules solitarii vel bini, 8—10 cm alt., graciles, erecti, recti vel subcurvati, rotundi, subsulcati, fistulosi, aphylli, griseolo-tomentosi et glanduloso-pilosi, pilis brevibus flaveolis rigidiusculis setaceis; folia omnia radicalia, numerosa, ad 7 cm lg. (cum petiolo) et 1.5—2 cm lt., oblongo-oblanceolata, pinnatisecta, segmentis triangularibus margine remote acuteque dentatis parvis, breviter petiolata, petiolis anguste alatis basi dilatatis, supra griseolo-viridia, tomentella, subtus griseolo-tomentosa; segmenta foliorum sicut dentes segmentorum apice rigide mucronulata, margine pilis non densis brevibus flaveolis eglandulosis rigidiusculis setaceis instructa. Calathidia solitaria, erecta; involucri campanulatum, 12—13 mm lg. et ca 8 mm lt. (tempore florendi); involucri phylla oblongo-lanceolata, acuminata, extus appresse griseolo-tomentella, exteriora appressa vel subreflexa, inaequilonga, non marginata, interioribus duplo breviora, interiora latiora, aequilonga, angustissime membranaceo-marginata, extus in parte media pilis brevissimis nigrescentibus glandulosis rigidis setaceis tecta, apice albo-ciliata, facie

interiore appresse pilosa; flores pallide rosei (in sicco), involucri duplo longiores; corolla 20—22 mm lg., ligula 2.5—3 mm lt., tubo 6—7 mm lg., pilis raris minimis conicis pubescente; rami styli flavi; achenia immatura; pappus 8—10 mm lg., albus. Fl. VII.

Habitat in schistosis in regione alpina Transcaucasiae orientalis (mons Kjapaz).

Typus: Azerbaidzhania, olim prov. Elisabetpolis (nunc Kirovabad), mons Kjapaz, declivitas australis, 9000—10000 ped. s. m., 13 VII 1909, fl., A. Schelkownikow; in Herb. Inst. Bot. Ac. Sc. in URSS in Leningrad conservatur.

Affinitas. A proxima *C. Willdenowii* Czer. floribus pallide roseis majoribus, foliis supra griseolo-viridibus parce pubescentibus, foliorum segmentis margine pilis haud densis rigidiusculis setaceis praeditis differt.

123. *C. Karelinii* M. Pop. et Schischk. ex Czer. sp. n. (sect. *Ixeridopsis* Babc.). — *C. nana* var. *laxa* Kryl. Фл. Алт. III (1904) 763 и Фл. Зап. Сиб. XI, 3044. — *C. pygmaea* auct. p. p. non L.: Б Федч. Раст. Турк. (1915) 765. — *C. nana* ssp. *typica* Babc. in Univ. Calif. Publ. Bot. 22 (1947) 540 p. min. p. (The Genus *Crepis*, 2). — *Youngia pygmaea* γ. *dentata* Ldb. Fl. Ross. II, 2 (1846) 838; О. и Б. Федч. Переч. раст. Турк. IV, 350, pro var. — *Y. pygmaea* var. *flaccida* auct. non Ldb.: О. и Б. Федч. цит. соч. (1911) 350. — *Y. pygmaea* var. *lyrata* auct. non Ldb.: О. и Б. Федч. цит. соч. (1911) 350. — *Y. pygmaea* var. *caulescens* Rupr. in Osten-Sacken et Rupr. Sert. tiansch. (1869) 59; О. и Б. Федч. цит. соч. 350. — *Y. pygmaea* auct. non Ldb.: Ковалевская во Фл. Узб. VI (1962) 498, excl. syn.

Planta glabra, glaucescens; radix elongata, tenuis, verticalis, apice in rhizoma breve, 1.5—4 mm lt., verticale, ramosum, rarius simplex, lignosum abiens; caules non numerosi, 4—10 cm alt., rotundi, striati, haud fistulosi, a medio vel fere a basi ramosi, ramis tenuibus, foliati; folia radicalia et inferiora caulina 2—4 cm lg. (cum petiolo) et 0.5—1.5(2) cm lt., oblanceolata, elliptica vel oblongo-oblanceolata (raro obovata), apice acutiuscula vel obtusa, remote denticulata, irregulariter sinuato-dentata, lyrato-vel pinnatilobata, interdum subpinnatifida vel integerrima, vulgo in petiolum tenuem, laminae aequilongum, ea subbreviorem, rarius longiorem sensim attenuata, media caulina 1.5—5 cm lg., radicalibus et inferioribus caulinis similia vel ut superiora caulina anguste oblanceolata vel lineari-lanceolata, apice acuta vel acutiuscula, integerrima, breviter petiolata vel sessilia. Calathidia 9—10-flora, pedunculata, pedunculis tenuibus subcurvatis 0.5—2.5 cm lg., in inflorescentiam corymbiformem laxam aggregata; involucrium cylindraco-campanulatum, 8(10)—13 mm lg. et 3—4 mm lt. (tempore florendi); involucri phylla exteriora in numero 4—5, inaequilonga, ovata vel ovato-lanceolata, acuta, non membranaceo-marginata, interioribus 5—8-plo breviora, interiora in numero 8, aequilonga, lineari-oblonga, acutiuscula, membranaceo-marginata (intima), subcarinata, non corniculata, apice crispe pilosa, facie interiore glabra; receptaculum glabrum; flores flavi, interdum praecociter pallide erubescens, involucri 1.5-plo longiores; corolla 11—14 mm lg., ligula ad 2(2.5) mm lt., tubo