

der Pflanze bekannt war. Gussone erwähnt sie für die Pflanze Siciliens, auch über die *Ruppia*-Formen der baltischen Küstenländer Deutschlands sind mir ähnliche Beobachtungen aus der Literatur und durch Mittheilungen des Dr. Pansch in Kiel bekannt geworden.

Lemna minor L. Zwischen Spalato und Salona (Huter). In der Süßwasserquelle bei Stagno mit *Callitriche stagnalis* Scop. (Ascherson). Vrgl. d. Ztschr. a. a. O.

Typha angustifolia L. An der Narenta und an Sümpfen bei Stagno (Ascherson). Vrgl. d. Ztschr. a. a. O.

Carduus acanthoides L. var. *enchelêus*¹⁾ Aschs. et Huter. Differt a speciei typo habitu vegetiore, foliis minus profunde pinnatifidis segmentis et lobis late ovatis, aculeis mitioribus, capitulis ut in varietate d) polyacantho (Schreb.) Rehb. fil. corymbosocongestis haud vero typo minoribus. Im Walde zwischen Cerkvica und dem Orjen, ca. 4000'! Von Huter auch zahlreich in den Gebirgswäldern am Lovćen in Montenegro gefunden, und herabgeschwemmt auf den Kiesbetten der Bergströme bei Cattaro.

Crepis alpestris (Jacq.) Tausch var. *moesiaca* Aschs. et Huter. Differt a speciei typo caule ramoso, pleiocephalo, capitulis minoribus. Am Kalkfelsen bei Cerkvica (Huter). Auch von Pančić (Verh. d. zool.-botan. Ver. in Wien 1856, 561) aus Serbien erwähnt.

Vincetoxicum Huteri Vis. et Aschs. n. sp. Caulis superne volubilis, more generis unifariam villosulus. Folia inferiora et media oblongo-vel subcordato-ovata, superiora cuneato-lanceolata, omnia acuminata, mucronata, subtus pallidiora, venosa, novella villosula, adulta glabra; petiolus villosulus, mediocris; cymae pseudo-axillares dichotomae 5—10-florae, foliis floralibus duplo breviores, breviter pedunculatae, pedunculo petiolum aequante; pedicelli pedunculo multo longiores, cum eo villosuli; calycis 5 partiti lacinae lanceolatae, acutae, margine villosulae, patulae, corollae (explicatae calycem quater superantis) 5 partitae flavovirentis lacinae oblongo-lineares, obtusae, apice callosae, extus glabrae, intus dense villosulae, faucem versus glabrescentes; corona staminea calyce brevior subcylindrico-scutelliformis, lobis 5 crassis late triangularibus apice recurvatis, membrana commissurali in lobulum coronae lobos subaequantem immo superantem producta conjunctis, ergo 10 lobata, gynostegii dodrantem aequans; antherae et stigma generis; fructus (immaturus) basi attenuatus, apice longe acuminatus, glaberrimus.

¹⁾ *Eγγέλαις* ist der Name eines mythischen, den Illyriern benachbarten Volkes, zu welchem sich, wie Apollodor erzählt, Kadmos und Harmonia in ihrem Alter zurückzogen. Der Localpatriotismus der Ragusäer nimmt ihr Gebiet als Schauplatz der dort erzählten Ereignisse in Anspruch, wie denn nach Vis. Fl. Dalm. I. 7. auf dem Berge Snjesnica, östlich von Ragusa vecchia, das Grab des Kadmos gezeit wird.