

fert, foliolis majoribus, stylis in capitulum amplius majusque coalitis, etc.

5. **Rosa obtusispina** Gdgr.

Præcedenti similis, sed ab ea recedit: 1^o foliolis minoribus; 2^o aculeis brevissimis, truncatis, obtusis haud aut vix pungentibus; 3^o petiolis subinermibus; 4^o pedunculis brevioribus, 7-10 mill. longis; 5^o fructu minore, evidenter utrinque depresso.

Hab. in sepibus *Galliae australis*. — Lot-et-Garonne: *Moirax* prope *Agen*, a cl. *O. Debeaux*, anno 1873 inventa.

6. **Crepis Perrieri** Gdgr. — *C. grandiflora* Perrier in *Billot exs.* n. 3431, *ex parte*, non Tausch!

Foliis oblongis, glabrescentibus, apice in acumen breve acutum productis, ex toto valde dentatis, haud runcinatis; pedunculis vix vel brevissime glandulosis, apice valde incrassatis, 3 mill. latis; involucri 13-14 mill. lato, radiis pallide luteis.

Hab. in pratis alpestribus *Sabaudiae*, ad *Colombaz* prope *Hauteluze*, 4,700' (*E. Perrier*).

Ex affinitate *C. grandifloræ* Tausch. in *Flora* XI, 1, p. 80, ut et sequens. In collectione Billotiana sub eodem numero, aliam vidimus speciem novam, ulterius examinandam.

7. **Crepis amphisœna** Gdgr.

Foliis oblongis sat pubescentibus, apice sensim rotundato-subobtusis, integrisque, sed a basi usque ad $\frac{3}{4}$ partem super. dentatis, haud runcinatis; pedunculis valde longissimeque glandulosis, sat incrassatis, 2-2 $\frac{1}{2}$ mill. latis; involucri 9-11 $\frac{1}{2}$ mill. lato, radiis intense luteis.

Hab. in alpestribus *Pyrenæorum centralium*, ad *Somâoute* (Bordère).

Pedunculi breviores, minus incrassati; folia magis villosa; caulis tandem elatior quam in *C. Perrieri* nostra.

8. **Lavandula Guinandi** Gdgr.

Caule valde elato, apice ramoso; ramis subpatulis, lateralibus medio multo brevioribus, apice flexuosis; foliis radicalibus oblongis, obtusiusculis, basi attenuatis, conspicue canescentibus, 5 $\frac{1}{2}$ -6 mill. latis, margine revolutis, caulinis autem lineari-oblongis, virescenti-subalbidis; spicis oblongis, haud interruptis, densiusculis; calyce pulverulento, bracteis partem calycis superiorem æquantibus.

Hab. in siccis *Pyrenæorum orientalium*: au bas d'*Ambouilla* (abb. Guinard), ubi frequens.

Pertinet, sicut et duæ sequentes, ad *L. latifoliam* Vill. fl. *Dauph.* II, p. 363.

9. **Lavandula decipiens** Gdgr.

Caule sat elato, apice parce ramoso; ramis lateralibus medio subbrevioribus, subflexuosis; foliis omnibus incanis, albis, oblongo-acutis, basi valde attenuatis, 4-4 $\frac{1}{2}$ mill. latis, margine revolutis; spicis obovatis, paucifloris, densis; calyce pulverulento, bracteis dimidiam inferiorem tubi partem æquantibus.

Hab. in *Gallia australi*: *Ile Sainte-Lucie* prope Narbonam, Aude, (Moquin-Tandon).

Præcedente paulo flexuosa, humilior, magis canescens.

10. **Lavandula cladophora** Gdgr.

Caule rigido, valde elato, apice ramoso; ramis flexuoso-arcuatis, ramorum angulis rubentibus; foliis oblongis, erectis, basi valde attenuatis, apice triangularibus, 3-4 mill. latis,