

Folia lanceolata, glabra, subdentata. Ramuli basi angustiores, quasi unus ex altero prognatus. Flores lutei, ad basin purpurascetes, at in disco flosculi atropurpurascetes fere toti. Semina teretia, coronata margine ciliari minutissimo & setis 2 simplicibus longis.

aspera.

4. CREPIS foliis dentatis: inferioribus ovatis auriculatis: superioribus sagittatis, caule setis rigidis sparsis.

Hieracioides sicula, cichorii folio, flore parvo flavescente. *Vaill. act.* 714.

Habitat in Oriente, Sicilia, Palæstina.

Caulis nudus, ramosus, asper: setis subulatis, rigidis, sparsis, patentibus. Flores fere cymosi pedicellis rigidis, subsessiles, alterni, excepto ultimo. Calyx parvus, ovatus, torulosus, hispida: exterior brevior foliolis ovatis, membranaceis, deciduis.

vesicaria,

5. CREPIS involucris ovatis concavis obtusis patentibus.

Hieracium montanum rapifolium. *Baub. pin.* 129. *prodr.* 749. *Raj. hist.* 237. *Morif. hist.* 3. p. 65. *secundum.* *Burf. VI:* 70.

- β. Cichorium pratense hirsutum vesicarium. *Baub. pin.* 126.

Cichorium sylvestre vesicarium pratense. *Col. ecphr.* I. p. 238. t. 237.

Habitat in Helvetia, β in Apulia.

Plantæ a Radix crassa. Folia lyrata, angulata, dentata, scabra. Caulis brevis. Rami longi, nudi, bifidi s. trifidi, uniflori, pedunculorum Bractææ ovata, solitaria, concava, integra, pallida. Flores lutei. Calyces singuli cincti Involucro longitudine calycis, ex foliolis 5. s. 6, patentibus, ovatis, obtusis, concavis, membranaceis, pallidis. Planta β. foliis a priori manifeste differt, flores vero conjungunt utramque.

eubra.

6. CREPIS foliis amplexicaulibus lyrato-runcinatis. *Vir. cliff.* 79. *Hort. ups.* 239. *Sauv. monsp.* 295. *Gouan. monsp.* 414.

Hieracium foliis caulinis sinuatis, calycibus ante florentiam nutantibus. *Hort. cliff.* 388.

Hieracium apulum, flore suaverubente. *Col. ecphr.* I. p. 244.

Hieracium intybaceum, floribus ex purpura rubentibus. *Baub. pin.* 128. *Raj. hist.* 231.

Hie-