

Cr. divaricata var. *canescens* pl. Cret. exs. 1847. — *Hieracium fætidum* Fl. græc. tab. 799 non Willd.

Hab. in saxosis montium Sphacioticorum Cretæ in monte *Stravopodia* (Heldr.) alt. 6000' (Sibth.).

Planta 3-5 pollic., folia 2-4 poll. circ. longa infima minus profundè dentata, caules supernè ad pedunculos alternos eximiè angulato-flexuosi, pedunculi crassi 3-4 lin. longi, capitula magnit. eorum *Cr. Nicæensis*. Primum retuleramus ad nostram *Cr. divaricatam* quæ accuratiùs comparata differt foliis longioribus profundiùs et acutiùs pinnatis præsertim caulibus divaricato-ramosissimis, pedunculis 1-2 pollices longis, involuci phyllis angustioribus parcè puberulis apice magis attenuatis. *Hier. fætidum* Willd. — *Crepis fætens* Frœlich in DC. Prodr. exs. planta Armena diversissima.

CREPIS MACROPUS Boiss. et Heldr. (Sect. *Eucrepis*.)

C. rhizomate crassiusculo nudo, collo squamoso, foliis radicalibus ad costam parcissimè hirsutis petiolatis runcinato-pinnatipartitis acuminatis segmentis omnibus retrorsis lanceolatis acutis integris vel denticulatis, caulibus puberulis simplicibus vel ad medium semel vel bis bifurcis 1-4 cephalis, foliis ad dichotomias angustè linearibus integris, pedunculis longis rectis squamulis setaceis paucis obsitis, capitulis mediocribus, calyculi squamis linear-lanceolatis numerosis inæquilibus adpressis, involuci phyllis densè farinoso-tomentosis lanceolato-linearibus acutiusculis, ligulis flavis concoloribus involucro sesquilongoribus, acheniis sub 12 striatis cylindricis rectis apice vix attenuatis pappo niveo eis longiori superatis.

Cr. divaricata var. *longipes* pl. Heldr. Anat. exs. 1846.

Hab. in collibus aridis Lycaoniæ ad occidentem urbis *Koniah Beycheher* versus. (Heldr.)

Planta 8-9 poll. longa, folia bipollucaria, pedunculi 3-4 poll. longi, capitula paulò majora eis *Cr. divaricatæ* et præcedentis a quibus differt foliorum segmentis longioribus, pedunculis longissimis, involucro valdè farinaceo-tomentoso, calyculi squamis numerosioribus.

CREPIS ATHOA Boiss. (Sect. *Eucrepis*.)

C. perennis, rhizomate cæspitoso, collo valdè squamoso, foliis radicalibus lanceolatis acutis in petiolum setulosum longè et angustè atte-

nuatis cæterū glabris lucidis lätè virentibus irregulariter et remotè dentatis dentibus brevibus triangularibus acutis, caule tenui erecto folia multò superanti superñe dichotomè 2-4 cephalo pedunculis longis rectis parcè linear-squamulosis, foliis caulinis 1-2 longè et angustè linearibus integris, capitulis mediocribus, involucrī brevissimè farinoso-tomentelli squamis accessoriis paucis triplò brevioribus linear-lanceolatis phyllis nigricantibus linearibus obtusiusculis angustè albo-marginatis, ligulis pallidè flavis concoloribus involucro sesquilongioribus, acheniis subangulatis multistriatis utrinquè vix perspicuè attenuatis pappo niveo pauciseto eis paulò longiori terminatis exterioribus subincurvis.

Hab. in rupibus montis Athonis. (Aucher N° 3277, Friw.)

Folia cum petiolo ferè triplicaria 4-6 lin. lata, caules 10-12 pollic., capitula magnit. *Leont. hastilis*. Species distinctissima ex affinitate *Cr. crocifoliae* Boiss. et Heldr. quæ differt foliis angustissimis integris, acheniis lèvibus apice valdè attenuatis, etc.

CREPIS RAULINI Boiss. (Sect. *Eucrepis*.)

Cr. perennis tota setis sparsissimis glanduliferis parcè obsita, rhizomate incrassato duro cæspitoso, foliis omnibus radicalibus viridibus oblongis in petiolum attenuatis parcè et remotè repando-denticulatis, scapis monocephalis folia paulò superantibus squamis paucis setaceis obsitis, capitulis mediocribus, squamis accessoriis paucis linear-setaceis adpressis involucro dimidiò brevioribus, involucrī phyllis angustè linearibus acutis præter pubem sparsam brevissimam farinaceam setulis glandulosis paucis obsitis, ligulis flavis concoloribus involucro vix sesquilongioribus, acheniis..., pappo niveo.

Hab. in Cretā undè retulit et mihi comm. cl. Dr. Raulin.

Planta mihi ex unico specimine nota specimina parva *Seriolæ levigatæ* quodammodo referens, folia pollicem aut paulò amplius longa 4-5 lin. lata acutiuscula acutè breviter et parcè dentata, scapi radicales bipollicares, capitula magn. *Cr. divaricatae* cui accedit sed a qua distinctissima.

CREPIS ELBRUSENSIS Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Hieracioides*.)

Cr. rhizomate filiformi nudo, foliis rosulatis confertis pilis albis