

Hab. in dumetis *Gallicæ austro-orientalis*. — *Isère*: prope pagum dictum *Charancieu*.

E tribu *Synstylearum* D. C. *cat. hort. Monsp.* p. 137, affinis *R. arvensis* L. *mant.* 240, pedunculis glabris præter notas supra allatas, ab eâ præsertim differt fructu obovato nec subgloboso.

7. **Rosa commiserata**, Gdgr.

Ramosissima, repens vel decumbens; aculeis raris, rectiusculis; foliis latè ovato-ellipticis, basi rotundatis, apice vix attenuatis, præter costam subtus hirtellam utrinque glaberrimis; serraturis simplicibus, ovatis; petiolis aculeatis, pubescentibus parcissime glandulosis; pedunculis hispidis; tubo-obovato glabro; sepalis ovatis subpinnatis, apice filiformibus; stylis ultra discum planum in columnam glaberrimam productis; petalis albis haud ciliatis; fructu ovoideo basi attenuato.

Habitat in *Galliâ boreali-occidentali*. — *Calvados*: *Arganchy* (Dr. E. Lebel).

Affinis *R. repentis* Scop. *fl. Carn.* I, p. 355 (1772) e tribu *Synstylearum*.

8. **Crepis Royi**, Gdgr.

Caulibus intricatissimis, numerosis, 12-15 cent. longis intense purpurascensibus; foliis obovato-oblongis, acutis, creberrime dentatis, subtus præsertim villosis; involucri usque ad $\frac{3}{4}$ sup. pilis glanduliferis obsito.

Habitat in alpibus *Delphinatus*. — *Isère*, *Piemeyan* (J. Roy).

E grege *C. pygmeæ* L. *sp.* 1131, ut et duæ sequentes.

9. **Crepis autaretica**, Gdgr.

Caulibus sat numerosis, 9-12 cent. longis, virentibus; foliis ovatis, obtusiusculis, vix dentatis, subtus tomentosis; involucri glanduloso.

Habitat in alpihus *Delphinatus* : *Le Galibier* au *Lautaret* (*Chabert*).

10. **Crepis subglabrescens**, Gdgr.

Caulibus sat ramosis, 6-10 cent. longis, aliis virentibus aliis pallide purpureis ; foliis obovatis, apice sat attenuatis, dentatis utrinque subglabrescentibus ; involucri basi tantum parcissime glanduloso.

Habitat in alpestribus *Pyrenæorum* centralium : *Cirque de Gavarnie* (*Bordère*).

Foliis minoribus, subtus interdum subrubentibus, anthodiis paulo minoribus quam in duabus præcedentibus.

DECAS VII.

1. **Rosa Brippii**, Gdgr. — *R. arvensis* var. *scabra* Baker. *Ros. Brit. exsicc.*

Aculeis numerosis aduncis, foliolis coriaceis, rigidis, nervosis late obovato-acutis, basi rotundatis, præter costam subtus glanduloso-subglaberrimam utrinquo lævibus, simpliciter serratis ; petiolis aculeatis, minute hirtellis, valde glanduloso-muricatis ; stipulis dorso glandulosis ; pedunculis hispidis ; tubo lævi, obovato-oblongo ; sepalis.... ; stylis ultra discum conicum in columnam glabram coalitis ; petalis..... ; fructu parvo, obovato, apice constricto.

Hab. in *Anglia*, in regione dicta : *the Devonshire* (*Bripp*).

Prope *R. reptentem* Scop. *fl. Carn.* I, p. 355, collocari debet, a qua eximie differt foliolorum forma, petiolorum glandulositate, etc.