

tibus magnis similibus aucta vel superiora omnino auriculis destituta. Phylla involucri nostrae speciei videntur pauciora praesertim externa perpauca et brevia. *C. Djimilensis* C. K. e Ponto Lazico potest nimis affinis esse, sed non habeo hujus specimina, quae comparem.

Crepis balcanica sp. n.

Perennis, radice fusiformi verticali, *caule foliisque aspero-hirtis omnino eglandulosis*, foliis radicalibus rosulatis oblongo-linearibus acutis acute runcinato-dentatis basi modice attenuatis sessilibus, caule erecto anguloso omnino aphylo vel foliis 1—2nis valde diminutis lineari-lanceolatis acuminatis subintegrifoliis *basi sagittata sessilibus* ob- sito superne in ramos 2—3nos arcuato-strictos tenues longos mono- cephalos bracteis linearibus fulcratos diviso, pedunculis *apice non in- crassatis* aphyllis, capitulis subminoribus, involucri phyllis lineari-ob- longis subobtusis integris *praeter tomentum album parcum setis pi- lisque longis nigris eglandulosis dense obsitis*, externis paucis multo brevioribus, acheniis apice attenuatis pallidis laevibus, pappo albo involucrum vix excedenti. Floret Augusto.

Caulis 15—24 cm, folia radicalia 6—7 cm \times 6—10 mm, invo- lucrum 1 cm \times 8 mm.

In pratis alpinis m. Vitoša legi a. 1889.

Similis *C. grandiflorae* Tsch., sed indumento, statura graciliore, foliis, capitulis minoribus ab ea diversa.

Campanula velutina sp. n.

Perennis, caule e collo crasso squamoso ascendenti-erecto soli- tario folioso crasso a basi pyramidatim ramoso ramisque molliter longe cano-tomentoso, ramis simplicibus tenuibus flexuosis horizon- talibus vel deflexis foliosis 1—3 floris, foliis pube mollissima densis- sima supra sericeo-velutina subtus magis cana vestitis, rosularibus longe petiolatis e basi profunde reniformi oblongo-ovatis obtusis in- aequaliter crenatis, caulinis longe petiolatis cordato-ovatis breviter acutis crenatis, summis et rameis diminutis ovatis vel lanceolatis acutis in petiolum late alatum abruptim attenuatis, floribus magnis, calycis molliter et dense cano-tomentosi laciniis sagittatis lobo medio in- tegro late lanceolato tenuiter acuminato tubo calycino 3plo longiore, lobis lateralibus appendicem longam acutam formantibus, corollae pallide luteae ad nervos et margines hirtellae laciniis tubo longe campanulato 2plo brevioribus. Floret Augusto.