

lis copiosis albis tecta. *Calyx villosissimus. Flos luteus speciosus diametro sesquipolllicari.* 24. D.

HIERACIUM andryalooides. 24. D.

— *collinum.* 24. D.

— *triohocephalum.* 24. D.

CREPIS bannatica.

C. foliis radicalibus lanceolatis dentatis, caulinis lanceolatis sessilibus a medio ad basin dentatis, dentibus inferioribus elongatis, pedunculis unifloris, calycibus hispidis, calyculo patulo.

• *Habitat in Banatu.* ♂. D. F.

C. *hispidae* et *agresti* affinis sed diversa radice bienni floribus non corymbosis, foliis caulinis sessilibus nunquam vero sagittatis. *Folia radicalia* glabra petiolata lanceolata vel obsolete petula vel leviter runcinato-dentata. *Caulis bipedalis* teres pilis patentibus rarisch spiculatis, ramis aliquot alternis instructus. *Folia caulinata* lanceolata sessilia glabra, costa media subtus hirta, a medio ad basin dentata, dentibus inferioribus elongatis. *Pedunculi uniflori.* *Calyx* foliola dorso hispida. *Calyculus* patulus, foliolis lanceolatis numerosis glabris.

— *nemorensis.* ♂. D.

— *nicaensis.* ♂. D.

— *raphanifolia.*

C. foliis radicalibus caulinisque inferioribus pinnatis lyratis, caulinis superioribus lanceolatis amplexicaulibus inferne dentatis, floribus corymbosis, calycibus pedunculisque glanduloso-pubescentibus calyculi foliis calyce duplo brevioribus bracteisque scariosis. 24. D.

Radix crassa perennis. *Folia radicalia* pilis rarisch minutis sparsis obsita, pinnata, foliola lanceolata subangulata subdentata, terminale maximum obtusum subintegerrimum subhastatum. *Caulis bipedalis* striatus pilis rarisch spiculatis. *Folia caulinata* inferiora pinnato-lyrata, superiora lanceolata amplexicaulia a medio ad basin profunde dentata. *Flores* corymbosi. *Pedunculi* glanduloso-pubescentes. *Bractae* ad basin pedunculorum oblongae ventricosae inflexae concavae integerrimae scariosae. *Calyx* glandulosopubescentes. *Calyculus* subpentaphyllus calyce duplo brevior, foliolis ovatis scariosae.