

J. F. Tausch *descriptiones plantarum minus cognitarum.*

1. *Sonchus nigricans*: foliis profunde pinnatifidis, laciiniis linear-lanceolatis undulato-dentatis margine rachique spinulosis, pedunculis umbellatis confertis anthodiisque nigricantibus subglaberrimis.

Habitat Neapoli ad Paesilippum, unde D. Sieber cum *S. italo Spr.* attollit. ◎

Glaberrimus. Caulis strictus erans subangulatus. Folia caulinata conferta cordato-auriculata amplexicaulia oblonga profunde pinnatifida, rachi laciiniis duplo angustiore subaequali spinuloso-dentata, laciiniis cuspidatis undulato- et conferte-dentatis et spinulosis, sinibus rotundatis, supra obscure virentibus subtus purpurascensibus, summa floralia linearia sinuato-denticulata. Flores terminales *S. olereaceo* maiores. Pedunculi pollicares umbellato-conferti, umbellis multifloris, basi squamis involucratis, et more congenerum proliferis. Anthodium cylindricum nigricans glaberrimum, squamis linear-lanceolatis dense imbricatis. Flosculi lutei concolores. Receptaculum nudum. Pappus pilosus niveus sessilis. Germen minimum ovali-compressum margine alato cinctum. Semen deest.

2. *Crepis Bauhiniana*: caule erecto apice corymboso foliisque lanceolatis hastato-amplexicaulibus runcinatis hirtis, pedunculis anthodiisque dense glanduloso-pilosis.