

- (1) in ruderatis pascuis muris tectisque Europæ totius et Sibiriae. Wallr. sched. 430 DC. cat. h. monsp. n. 83. fl. fr. suppl. 5. p. 448. Sow. engl. bot. t. xxxi. C. Dioscoridis Poll. pal. n. 750. Cr. varia Moench. An Cr. angustifolia d'Urv. enum. pl. arch. 101. n. 749? Cor. sulphurea. (v. v. et s.)
- β. *segetalis* (Roth germ. 11. 2. 254. Wallr. sched. l. c.), caule simplicissimo, foliis infer. dentatis, paniculâ oligocephalâ. (1) in arvis. C. stricta Schultz fl. starg. suppl. 41. ex Bl. et F. Leontodon autumnale fl. dan. t. 501. (v. s.)
- γ. *gracilis* (Wallr. sched. l. c.), caule simplici gracillimo 3-4-cephalo, foliis caulinis omnibus subintegerrimis linearibus. (1) in sterilibus arvis. Crep. Lachenalii Gochn. diss. cich. p. 19. t. 3. DC. fl. fr. 5. p. 449. cat. h. monsp. n. 80. — An Hall. helv. n. 32. (v. v. et s.)
13. C. AGRESTIS (Waldst. et Kit. in Willd. sp. 3. p. 1602. pl. rar. hung. t. 3. 220), caule erecto, foliis radicalibus basi attenuatis lanceolatis dentatis runcinatis, caulinis lanceolatis sessilibus sagittatis, paniculâ subcorymbosâ, pedicellis involucrisque glanduloso-hispidis, achæniis tereti-linearibus pappo brevioribus secùs costas laevibus. (1) in agris aggeribus pratisque siccis Hungariæ (W. et Kit.), Tauriæ (Stev.!), in dumetis ad mare Caspium (Mey.!), in Bohemiâ (Tausch), Croatiâ (Hez.). Crep. Banhiniana Tausch in florâ 1829. erg. p. 33. ex Reichb. sed excl. syn. Bauh. Variat hispida aut ferè glabra, foliis dentatis runcinatisve. (v. s.)
14. C. ADENANTHA (Vis. in florâ 1830. p. 53) minutè hirtella, caule erecto simplici sulcato apice corymboso subnudo, foliis radicalibus lyrato-runcinatis petiolatis, superioribus sessilibus integerrimis lanceolato-linearibus, pedicellis involucrisque setoso-glandulosis, calyculi squamis linearibus acuminatis, achæniis sulcatis laevibus. (1) in asperis sylvaticis Dalmatiæ in montibus ditionis Ascriviensis (Vis.) seu Cattarensis et ad Pastrowich Albaniæ Austriacæ (Tom.!). Rarissima! Fl. julio. Pedalis et paulò ultrà. Radix simplex. (v. s. comm. à cl. Tomasini.)
15. C. BIENNIS (Linn. sp. 1136), hispidula, caule erecto sulcato, foliis infer. runcinato-pinnatifidis, super. lanceolatis dentato-pinnatifidis, paniculâ corymbosâ, invol. squamis margine scariosis, exter. linear-lanceolatis, achæniorum costis laevibus. (1) in Europæ pratis frequens. Sow. engl. bot. t. 149. Gærtn. fr. 2. t. 158. f. 8. DC. fl. fr. n. 294. cat. h. monsp. p. 98. C. Scanensis Linn. it. scan. 170. Cr. Sabauda Balb.! herb. Hedypnois biennis Huds. angl. 342. Flores flavi, subtùs rubentes. Achænia longa subcompressa. Canlis 3-4-pedalis. (v. v. et s.)
- * *prolifera*, floribus in invol. longè pedicellatis achæniisque subhirtellis. — circè Gottingam in monte der Hohe Hagen hoc monstrum legit cl. Roeper. (v. s.)
- β. *Americana*, foliis latioribus plerumque runcinato-dentatis, rariùs pinnatifidis nunc omnino integerrimis. — ad lacum Huron in pascuis Saskatchewan et in montibus rupestribus Amer. bor. Hook. fl. bor. am. 1. p. 297. An sp. propria?
16. C. SCABRA (Willd. sp. 3. p. 1603), caule erecto striato apice paniculato-corymboso supernè glabro basi hirtello, foliis radicalibus lanceolatis utrinque attenuatis subpetiolatis inciso-runcinatis hirsuto-scabridis, caulinis sessilibus sagittatis, invol. squamis subhirtellis margine scariosis, ext. linear-subulatis, achæniis teretiusculis striatis secùs costulas laevibus. (1) in asperis Galliæ australis et agri Nicæensis DC. cat. h. monsp. p. 99. Crep. Nicæensis Balb.! misc. alt. p. 28. C. seabra et Nicæensis Pers. enc. 2. p. 376. (v. v. et s.)
17. C. LODOMERIENSIS (Bess. gallic. 2. p. 150), subhispidula, caule sulcato-angulato apice corymboso, foliis infer. oblongis sæpè dentatis basi attenuatis, sup. lingulato-linearibus basi lobulo angustissimo utrinque auctis cæterum integerrimis, pedicellis involucrisque junioribus farinoso-pubescentibus, calyculi squamis linearibus acuminatis. — in arenosis herbidis Galliciæ circè Dulam (Bess.), Hungariæ (Host), Bavariæ (Schnitz), Austriae, Bohemiæ, Saxonie