

cemstriatis. 2l. In locis apricis, rupestribus, (im östr. Littorale, Triest, Fiume; auf d. Berge Zhaun im Innerkrain.) Jun. Jul. C. Adonis Spreng. pug. 1. p. 54. Andryata chondrilloides Scop. carn. 2. p. 115. t. 52. Wibelia chondrilloides Hopp. et Hornsch. decad. Berinia andryaloides Brign. G.

7. C. BIENNIS (L. sp. 1136.) caule foliato apice corymboso, foliis dentatis vel runcinato-pinnatifidis, caulinis sessilibus subamplexicaulibus planis basi auriculato-dentatis, summis integerrimis, involucri foliolis omnibus oblongo-linearibus obtusiusculis cano-puberulis, exterioribus patulis, interioribus dorso hispidis glabrisve superficie interiori subsericeo-pilosis, acheniis apice angustioribus 13 striatis. ☉. In pratis et sylvaticis humidiusculis ubique. Mai. Jun. Engl. bot. 149. Variat caule foliisque hispidis et subglabris, atque, ut omnes affines, magnopere quod divisionem foliorum attinet.

α. runcinata, foliis subaequaliter runcinatis apice integris, laciniis deorsum sensim sensimque minoribus: C. biennis α. Wimm. et Grab. fl. sil. p. 172. C. Iodomiriensis Bess. galic. p. 159.

β. lacera, foliis inaequaliter runcinato-pinnatifidis vel lacero-pinnatifidis: W. et G. l. c. C. biennis var. bannatica Roch. pl. rar. bann. fig. 61.

γ. dentata, foliis elongatis, lineari-oblongis, inferioribus dentatis, superioribus integerrimis.

8. C. NICAENSIS (Balb. ap. Pers. syn. 2. p. 376) caule foliato apice corymboso, foliis dentatis runcinatisve, caulinis sessilibus subamplexicaulibus planis basi sagittatis, auriculis acuminatis deorsum directis, summis integerrimis, involucri foliolis lanceolatis attenuatis cano-puberulis, exterioribus patulis, interioribus dorso hispidis superficie interiori glabris, acheniis apice attenuatis 10 striatis. ☉. In pratis siccis, (bei Knielingen in d. Gegend v. Carlsruh, Alex. Braun; wahrscheinlich auch bei Mannheim, von Mertin daher mitgetheilt.) Jun. Jul. C. nicaensis Balb. ! in herb. Willd. sub. n. 14734. C. scabra DC. fl. fr. 5. p. 446., non Willd., quae posterior ad Borkhausiam taraxacifoliam pertinet. G.

8. C. TECTORUM (L. sp. 1135.) caule foliato corymboso, foliis radicalibus lanceolatis dentatis vel runcinato-pinnatifidis, caulinis linearibus sessilibus sagittatis margine revolutis, involucri foliolis lanceolatis attenuatis pedunculisque cano-pubescentibus, exterioribus linearibus patulis, interioribus in superficie interiori adpresse pilosis, acheniis 10 striatis apice attenuato-contractis subrostratis, rostro scabro. ☉. In agris, (stellenweise durch d. ganze Gebiet.) Mai. Jun. C. tectorum L. fl. suec. p. 275., testibus speciminibus, ab Ehrharto Linnaei tempore Upsaliae lectis. Fl. d. t. 501. Schk. t. 222., fruct., C. Dioscoiridis Poll. pal. 2. p. 399. Gochn. diss. de pl. cichor. t. 2. DC. fl. fr. 5. p. 448. C. stricta Schultz. starg. suppl. p. 1. Varietas foliis radicalibus integris subdentatis: C. tectorum β. segetalis Roth. bot. abh. p. 37. C. Lachenalii Gochn. l. c. t. 3., non Gmel. — Stigmata fusca; hac nota, foliis radicalibus terrae adpressis, caulinis superioribus linearibus margine reve-