

5. *HIERACIUM ERIOCEPHALUM*.

H. caule lanato ; foliis radicalibus paucis, longe petiolatis, caulinisque lanceolatis, acutiusculis, remote denticulatis vel subintegris, supra parce pilosis, subtus lanatis ; corymbo densiusculo, oligo-poly-cephalo ; capitulis pedunculisque lana longa pallideque ferruginea dense vestitis ; achæniis subcuneiformibus.

β *nanum*.

Tiges solitaires ou au nombre de 2 à 4, dressées, hautes de 2 à 4 décimètres, munies à la base, au moment de la fleuraison, d'une ou de deux feuilles radicales longuement pétiolées. Capitules en nombre très variable et plus ou moins longuement pédonculés, ordinairement presque dissimulés par la laine abondante qui enveloppe les involucre.

Hab. ÉQUATEUR : environs de la ferme d'Isco sur le mont Antisana (Hartweg, *exsicc.*, n. 1177). — BOLIVIE : environs de Chuquisaca !, dans la région alpestre (d'Orbigny, n. 1192).

LXV. *CREPIS*.

Crepis Moench., *Meth.*, 534 ; DC., *Prodr.*, VII, 160.

Obs. — Ce n'est pas sans hésitation que je décris ici, comme un *Crepis*, une plante qui ne diffère absolument des *Hieracium* que par son aigrette blanche, d'autant mieux que je m'aperçois que M. Fries a admis dans ce genre une espèce mexicaine qui a mérité de lui l'épithète de *niveopappum*. La généralité des auteurs s'accordant cependant à regarder la couleur de l'aigrette comme offrant encore plus de valeur que le plus ou le moins de fragilité de ses soies, je me suis décidé provisoirement à me mettre de leur côté.

* *CREPIS BOLIVIENSIS*. † (Pl. 42, A.)


C. caule subsimplici vel superne ramoso, folioso, undique pilis longis patulisque fulvis nigricantibusve hirtis ; foliis radicalibus oblongo-vel obovato-spathulatis, obtusis, remote denticulatis vel subintegris ; caulinis pluribus, subæqualibus, ovato-oblongis, acutis, basi amplexicauli auriculatis, remote denticulatis, sicut radicalia utrinque ferrugineo-hirtis ; panicula oligo-polycephala, laxa, magis minusve foliosa, capitulis centimetralibus ; foliolis involucri lanceolatis, puberulis, pedunculisque (tomentosis) plus minus fulvo-hirtis ; achæniis columnaribus, atro-rubentibus, pappo niveo.

Hab. BOLIVIE : Région alpestre du mont Curit, dans la province de Tomina (Wedd.).

EXPLICATION DES FIGURES.

F. 1 : individu florifère, de grandeur naturelle ; — f. 2 : fleur ; — f. 3 : étamine ; — f. 4 : une des soies de l'aigrette.





Riocreux lith.

Bertrand Editeur.

Lithographie Gony Gros. Paris

A: CREPIS BOLIVIENSIS Wedd.

B: HIERACIUM FRIGIDUM Wedd.