

laxe et irregulariter dentata, membranacea; nervi secundarii 6-7 utrinque, tenues, venulis numerosis rete densum efformantibus. Inflorescentiæ axillarés terminalesque, ambitu corymbum amplum efformantes; pedunculi graciles, breviter denseque pilosi; capitula sessilia, aggregata, dein laxiuscula, bracteis ovato-acutis, ciliatis, dorso subglabris, brevibus, floribus ♀ numerosis, centralibus ♂, circa 15. Pappus albidus persistans. Corolla ♀, pappo duplo brevis, apice 3-denticulata, denticulis acuminatis; cor. ♂ apice campanulata, 5-lobata, lobis ovatis, acutiusculis. Stamina 5; anthera apice triangula, basi truncatò-auriculata. Ovarium pilosulum; stylus ♂ bifidus, cruribus brevibus, lanceolato-obtusis. Achænium compressum, pilosulum. — Herba 50 cm. et ultra alta. Folia infima 13 × 5 cm., media et suprema 10-3 cm. × 40-15 mm. Involucri bracteæ 2-3 mm. longæ, capitula 5-7 mm. diam. Achænium 1 mm. longum.

INDO-CHINE : sans indication de localité (*H. d'Orléans*).

Cette espèce nouvelle a été récoltée par le prince d'Orléans, dans son voyage du Tonkin à Bangkok (Siam). Elle a donc pu être récoltée au Tonkin occidental, au Laos ou au Siam. Elle est très remarquable par ses grandes feuilles obovales-lancéolées à la base, ovales plus haut, et de plus en plus embrassantes; par ses capitules petits et courts; par la brièveté des bractées de l'involucre.

Crepis Bonii Gagnep., n. sp.

Herba annua. Radix gracilis. Caulis erectus, fistulosus, striatus. Folia graminea, radicalia basi longe attenuata, apice longe et tenuiter acuminata, caulinea conformia sed breviora basi late amplexicaulia et auriculata, auriculis acutis, suprema gradatim decrescens, omnia integra vel breviter rariterque retrodentata; nervus medius solitarius, cæteri tenues, subinconspicui. Inflorescentia terminalis breviter, laterales longius pedunculata, superantes, omnes corymbosæ, umbelloideæ, plurifloræ; pedunculi filiformes, capitula æquantés vel iis longiores; capitularum bracteæ extimæ 5-6, ovato-acuminatæ, brevissimæ, intimæ æquales, linear-acuminata, apice flexuoso, vix ad marginem scariosæ; flores circa 10. Pappus candidissimus, setis tenuibus mollibusque. Corollæ luteæ ligula 5-denticulata. Stamina 5; antheræ brunneæ rotundatim apiculatæ, basi breviter auriculatæ. Ovarium infra apicem constrictum; stylus papillosus, cruribus 2, brevibus, papillosis. Achænium fusiforme, 10-costatum, costis prominentibus subulatis, longe rostratum. — Caulis 30-50 cm. altus. Folia radicalia 15-20 cm. longa, 5-10 rarius 15 mm. lata. Involucri bracteæ extimæ 1 mm. longæ, intimæ 5 mm. longæ. Ligula 2,5 mm. longa. Antheræ 1 mm. longæ. Achænium 4 mm. (rostrò 1,5) longum.

TONKIN : vers Hanoï, entre Lan-mat et Lat-son, n° 1 979; champs de Ké-luong, n° 2 408; prov. de Ninh-binh, à Ha'o-nho, n° 1 383 (*Bon*); Tu-phap, n°s 3 060, 3 062 (*Balansa*); Hanoï, n° 331 (*d'Alleizette*). — CHINE : Hong-kong, *C. Wright*, U. S. North

Pacific Exploring Expédition, en mélange avec *Lactuca versicolor* Sch.-Bip. in herb. Mus. Paris.

Cette espèce ne figure ni dans le *Flora hongkongensis* de Benthham, ni dans le *Flora of Kwang-tung and Hong-kong* by Steph. Troyte Dunn and W. J. Tutchter in *Kew Bull. Addit.*, series X. Sans doute elle aura été confondue avec des Composées très ressemblantes, comme *Lactuca versicolor* Sch.-Bip. ou bien elle y est extrêmement rare et, a pu ainsi passer inaperçue. Elle a dû être propagée avec les graines qui accompagnent les semailles de riz. C'est dans les champs en friche qu'on la rencontre le plus souvent au Tonkin, bien qu'elle se trouve, au dire de Bon, n° 1383, sur les pelouses sèches des montagnes.

Crepis Coronopus Gagnep., sp. n.

Herba perennans vel bima. Caules erecti, undulati, striato-sulcati. Folia radicalia multa, rosulantia, pinnatipartita, lobis alternis vel suboppositis, obovato-linearibus, obtusis vel obtusiusculis, remotis, infimis minoribus; petiolo angustissimo, basi amplectente; f. caulina conformia sed minus lobata, sessilia, amplectentia; f. suprema vix sinuata, linearilanceolata, basi hastata, auriculis dentatis. Inflorescentia terminalis, subsessilia, laterales superantia, omnia corymbosa, pluriflora; pedunculi capillares, capitulis majores; capitula cylindracea minuta; bracteis extimis 5, deltoideis, intimis circa 10, linearibus, breviter acuminatis, margine scariosis; flores usque 20. Pappus candidus, tenuis mollisque. Corollæ ligula truncata, 5-denticulata. Stamina 5; antheræ brunneæ, rotundato-apiculatæ, basi auriculatæ, auriculis subulatis. Ovarium infra apicem constrictum; stylus papillosus, cruribus 2, papillosis. Achænium late fusiforme, tenuiter rostratum, 10-costatum, costis subalatis. — Caules 10-30 cm. alti. Folia radicalia 10-15 cm. longa, lobis 1-2 cm. longis, terminale 2,5-4 cm. longum. Capitula 3 mm. lata, bracteis extimis 4 mm., intimis 5 mm. longis. Corollæ ligula 2 mm. longa. Antheræ 1 mm. longæ; styli crura 0,6-0,7 mm. longa. Achænium 4 mm. (rostrum 1,5 mm.) longum.

TONKIN : Tu-phap, n° 3061 (*Balansa*). — LAOS : Nong-kay, Kemmarat, Ubon, sans n° (*Thorel*).

Espèce très remarquable par la forme de ses feuilles radicales qui sont, plus en grand, celles du *Plantago Coronopus*. L'achaine est rostré finement et longuement, et les côtes de la partie fertile, presque aussi épaisses que larges, sont saillantes plus que dans la plupart des autres espèces.

Crepis tonkinensis Gagnep., sp. n.

Herba nana, perennans. Radix descendens, crassa. Folia omnia radicalia, numerosa, obovato-oblonga, apice obtusa vel rotunda, basi atte-