

Crepis brachypappa Bornm. (spec. nov.). — Sectio *Barkhausia*. — Tabula nostra XIX. 2.

Annua vel perennans, collo pluricipite; caulis inferne plus minusve setulosus, pedibus vel altioribus, inferne foliatis, furcatis (ramis erecto-patulis) 2—4-cephalis; foliis parce hirsutis, inferioribus pinnati-partitis sublyrativse lobo terminali majusculo oblongo repando-dentato, lobis lateralibus ovatis vel triangularibus basi confluentibus, caulinis biauriculatis ad basin laceris; pedunculis glabris vel subglabris eglandulosis, virgineis, cernuis; capitulis majusculis, fructiferis cum pappo exserto 25—30 mm longis; involucrio florifero hemispherico vel globoso, fructifero sub apice valde constricto; phyllis externis linearibus subsubulatis demum patentibus, internis eis triplo longioribus parce tantum araneosis et (fructiferis) ad dorsum carinato-incrassatum setis latiusculis varie longis patulis (minoribus interdum glanduliferis) subflexuosis hispidulis; achaeniis breviter setulosis vel scabridulis, omnibus (internis nec non externis!) in rostrum tenue eis triplo longius attenuatis; pappo niveo, parvo (3 mm tantum longo).

Kerind, in m. Noa-Kuh (14. V. 1910) et (ditionis m. Schahu) in m. Kuh-i-Marab, Paintakh (V. 1910).

Unsere Pflanze nimmt wie *C. fallax* Boiss. (fl. Or. III. 850) eine Mittelstellung zwischen *C. foetida* L. var. *rhoeadifolia* M. B. (spec.) und *C. setosa* Hall. ein, teilt also mit letztgenannter Art der Eigenschaft, daß sowohl die äußeren Hüllkelchschuppen als auch die auf dem Rückenwulst der inneren Hüllkelchschuppen befindlichen langen Borsten später abstehen. Dadurch ähnelt *C. brachypappa* Bornm. der *C. setosa*, deren Köpfchen allerdings kleiner und Achaenen kürzer geschnäbelt, Stengel steifbehaart und deren Borsten des Hüllkelches derber sind. Da der in ihrem Formenkreis nur wenig bekannten kleinasiatischen *C. fallax* Boiss. „*achaenia marginalia erostria*“ zugeschrieben werden, bei unserer persischen *C. brachypappa* aber auch die randständigen Achaenen in einen sehr langen Schnabel auslaufen, so läßt sich unsere Pflanze ebensowenig zu *C. fallax* stellen. Vor allem sind, was Boissier beim Vergleich seiner *C. fallax* mit *C. foetida* L. (sensu ampl.) nicht entgangen wäre, die Pappushaare der *C. brachypappa* auffallend kurz, d. h. nur 3 mm lang, während sie bei *C. foetida* L. fast doppelte Dimensionen aufweisen. Nach den kräftigen, am Kuh-i-Marab gewachsenen Exemplaren zu urteilen, ist *C. brachypappa* zu den 2-jährigen Arten zu stellen.

Crepis foetida L. var. *glandulosa* (Presl.) Bisch. — Boiss. III. 851.
(*C. glandulosa* Presl. in synonym. *C. foetidae* L.).

Sungur, in m. Kuh-i-Emrullah (3. VI. 1908).

Hieracium procerum Fries. — Boiss. III. 864.

Nehawend, in m. Kuh-i-Gerru (VIII. 1907).

Hieracium incanum M. B. — Boiss. III. 865. — Bornm., Pl. Str. XX.
176.



1a. *Crepis Elymaïtica* Bornm.

2a. 2b. *Crepis brachypappa* Bornm. (spec. nov.).

Nat. GröÙe.