

(Reich.), in arvis et ruderatis Dahuriæ (Turcz.), Sibiria (Gmel.) Hieracium, etc. Gmel. fl. sib. 2. p. 28. t. 11 nec 12. Crepis Gmelini Schultz fl. bav. Cr. agrestis Sädl. non W. et Kit. Crepis tectorum var. Ledeb.? (v. s.)

18. C. STENOMA (Turcz! in litt. 1833), glaberrima, caule erecto simplicissimo, foliis lingulato-lineariibus, inferioribus obtusis basi attenuatis denticulatis, super. sessilibus integrerrimis acutis, paniculâ racemosâ contractâ, capitulis circ. 9-floris cylindraceis, calyculi squamis parvis acutis. (2) in salsis Dahuriæ ad lacum Tarei et Mongoliæ Chinensis detexit cl. Turczaninow. Herba sesquipedalis. Fol. inf. 3 poll. longa, 3 lin. lata. Flores lutei. Pappus albissimus. Achænia longit. striata. (v. s.)

19. C. BUNGEI (Ledeb. ex Turcz! in litt. 1833), tenuissimè arachnoidea seu glabrinacula, caule strictè erecto folioso simplici, foliis oblongis integris seu retrosum dentatis utrinque acuminatis, corymbo 2-6-cephalo, pedicellis squamosis apice involucrisque nigro-pilosis, invol. squamis acuminatis margine scariosis. 2 in insulis Kuraicis fl. Tschuja et ad fl. Lena Sibiria (Ledeb.), ad Baicalem, in paludosis humidis ad ostium Kiachta Dahuriæ (Turcz!). Hieracium strictum Ledeb. fl. alt. 4. p. 132. excl. indic. icon. H. uliginosum Turcz! in litt. — Gmel. sib. 2. p. 30. n. 26. t. 13. f. 1. — C. Bungeana Mey. ex Bunge! in litt. est var. 1-cephala. (v. s.)

20. C. ANDRYALOIDES (Lowe! prim. fl. mad. p. 25), sparsè hispida, caule erecto subfistuloso supernè laxè paniculato, foliis omnibus indivisis oblongis acuminatis remotè dentatis subsinuatis sessilibus, super. acutè auriculato-cordatis, capitulis remotis, pedicellis divaricatis, involucrisque glanduloso-hirsutissimis. (2) in convallibus ora septentr. Maderæ. Achænia equidem vix matura erostria, an ex cl. Lowe demum rostrata? Invol. squam. erectæ persistentes. Radix carnosa. (v. s. comm. à cl. inv.)

Sect. IV. INTYBELLIOIDES. — Intybellia Monn. nec Cass. — Geraciæ sp. Reichenb.

Invol. biseriale basi calyculatum. Achænia columnaria. Capitula cylindracea. Scapus subpolycephalus. — (Auct. cl. Frölich.)

21. C. MAURITIANA (Fröel. in litt. 1837), scapis cespitosis aphyllis subdicephalæ, foliis lyratis glabris, pedunculis terminalibus involucrisque glabris. 2 in insulâ Franciæ. Hieracium Mauritianum Willd. herb. 14637! Folia lyrata, lobo terminali ovato sinuato denticulato, suprà glabra, subiùs setulis minimis scabriuscula. Flores lutei minuti, illis Hier. paniculati minores, nubiles cernui. Invol. basi calyculatum 12-14 flosculis refertum. Germen angulatum scabrum. Structura involueri omnino eadem ac in sequentibus. (v. e. sp. comm. à cl. Commers.)

22. C. GMELINI (Fröel. in litt. 1837 non Schult.), scapo aphylio, foliis spatulato-lanceolatis sinuato-dentatis glabris, involucro cylindraceo peduncolorumque apice glanduloso-hispidalis. 2 in Sibiria ad Irkutiam et Ochotiam. Hieracium Gmelini Linn. sp. 1127. — Gmel. sib. 2. p. 23. t. 8. f. 2! bon. Scapus vix spithamalis corymbo oligocephalo terminatus. Flores parvi Prenanth. Chondrill. magnitudine et formâ similis. (v. s. sp. in herb. Gærtneriano et Stuttgart. comm. à cl. Gmel.)

23. C. PRÆMORSA (Fröel. in litt. 1837), scapo polycephalo racemoso foliisque obovatis subcrenato-denticulatis molliter hirtis, involucro cylindraceo calyculato glabriuscule, ligulis apice truncatis. 2 in herbidis apricis montosis Europæ, Sibiria. Hieracium præmorsum Linn. sp. 1126. Gmel. sib. 2. p. 32. t. 13. f. 2. opt. fl. dan. t. 942. Willd. herb. 14657! DC. fl. fr. 4. p. 18. Hier. lactucaceum Schrank. fide herb. Geracium præmorsum Moesl. et Reichenb. fl. 2. 1367! Intybellia præmorsa Monn. ess. p. 79. Intybus præmorsus Fries. novit. ed. 2. p. 245. Huc cl. Ledeb. adducit Gmel. fl. sib. 2. p. 32. n. 28. t. 13. f. 2, quod ad H. lactucaceum Gmel. syst. 1177 citatur. Flos luteus.

f. glabrata, scapo foliisque glabris. (v. s.)