

Ar. Geogr Europa omnis media et australis ab Angliâ, Belgio et Germaniâ ad Rossiam mediam et australem, Africa borealis.

50. **C. Bureniana**, caule humili a basi divaricatim ramoso folioso tomentoso et setoso-hispido, foliis inferioribus oblongo-lanceolatis breviter petiolatis pinnatifidis vel runcinatis, caulinis amplexicaulibus oblongis inferne dentatis omnibus plus minus tomentoso-canis prætereaque margine et ad nervos aculeolis albidis plus minus obsitis, pedunculis virgineis nutantibus, capitalis mediocribus, involucri albo-tomentosi prætereaque setis longis tenuibus crebre obsiti phyllis externis paucis brevissimis internis demum naviculari-compressis incurvis, flosculis involucri vix longioribus, acheniis marginalibus phyllis involutis apice subangustatis lateraliter compressis incurvis dorso striatis ventre subfungosis obtusis lævibus, centralibus subcompressis aculeolato-scabris striatis rostro æquilongo vel longiore superatis ☉.

Hab. in Babyloniâ ad Kerkuk et Persiâ austro-occidentali ad Schahpur (Haussk!), inter Abuchir et Schiraz (Ky. 696!), in Persiâ orientali ad Kerman et Chabbise (Bge!), prope Yezd (Buhse!), in Belutschîâ (Stocks 1053!). Specimen incompletum e deserto Syriaco ad Palmyram (Bl!) huc quoque spectare videtur

Planta 3-4-pollicaris rarius semipedalis, præter indumentum distinguitur a formis pumilis *C. fetidæ* foliis caulinis latioribus, flosculis vix exsertis, phyllis latioribus et brevioribus, acheniis internis subcompressis magis aculeolatis et exteriorum formâ quâ ad sectionem *Gatyonam* accedit. Dicata amic. Bar a Büren qui eam coluit et a *C. fetidâ* distinctam esse observavit.

51. **C. Kotschyana**, caule humili simplici vel parce et dichotome ramoso hirtulo prætereaque remote setoso, foliis puberulis margineque aculeolis albis obsitis lineari-lanceolatis dentatis vel pinnatifidis inferioribus in petiolum attenuatis caulinis amplexicaulibus, pedunculis virgineis nutantibus, capitulis minutis, involucri tomentosi prætereaque longe crebre et tenuiter setosi phyllis externis paucis brevibus cæteris demum naviculari-compressis, flosculis involucri vix superantibus, acheniis marginalibus phyllis inclusis apice attenuatis compressis striatis, centralibus subcompressis striatis superne asperis breviter attenuato-rostratis ☉.

Hab. in lapidosis Persiæ australis inter Fasa et Schiraz (Auch. 4876!), ad Schiraz (Ky. 173!), ad Persepolin (Ky. 289!).

Planta 2-6-pollicaris, capitula eis *B. fetidæ* subduplo minora ea *Hispidellæ Hispanicæ* referentia; species indumento, flosculis brevibus, involucri, valde affinis *C. Burenianæ* sed differre videtur præter folia angustiora acheniis marginalibus latere interiori non lævibus fungosis, interioribus brevissime attenuato-rostratis

52. **C. senecioides** (Del. Fl. Eg. 118. tab. 42. fig. 2) sub lente parce et brevissime hirtula, caulibus pluribus ascendentibus pumilis subnudis simplicibus vel bifidis oligocephalis, foliis radicalibus lanceolato-linearibus vel anguste oblongis dentatis vel sublyratim pinna-