

Jacq. coll. 5, 148.) — Auf sonnigen Hügeln zwischen Gesträuch (*Bmg.* l. c.) Jul. Aug. Im westlichen Siebenbürgen: Deva, Dobra, Broos. — Ist in unserem Floragebiete nicht so gemein, als *Bmg.* angibt.

465. CREPIS *L.* p. p.

Sect. I. Hieracioides DC. seu *Catonia* Mönch.

2109. *C. sibirica* *L.* sp. 1135. — *DC.* prodr. 7, 167. — *Ledeb.* Ross. 2, 828. — (*Hieracium sibiricum* *Lam.* — *Tratt.* Oestr. t. 140. — *Gmel.* Sib. 2, t. 10. — *Sogeria sibirica* *Monn.* — *Sonchus caucasicus* *Biehl.* — *S. flexuosus* *Ledeb.*) — Caule 2–3 ped. erecto, stricto, apice corymboso plus minus hirsuto. Foliis magis minusve hirsuto scabris obscure viridibus ellipticis, oblongisve, rugosis, grosse dentatis; caulinis inferioribus in petiolum profunde dentatum amplexicaulem attenuatis; mediis sessilibus amplexicaulis; supremis oblongis lanceolatisve sessilibus. Anthodiis maximis speciosis. *C. grandiflorae* similibus, sed peranthodii foliolis carina dense setosis demum subinde glabris, exterioribus laxe patentibus. Flosculis aureis. — In Bergwäldern, schattigen Bergwiesen, 3000'–4000'; auf dem Korondsys und dem Kuhhorn bei Rodna; bei Klausenburg (Bogdani); Butsets bei Kronstadt; auch in den Fogaraser Gebirgen, Kolzu–Brasi 5000'. Jul. Aug.

2110. *C. grandiflora* *Tausch.* *Flora* IX, 1, p. 80. — *DC.* prodr. 7, 176. (*Hieracium grandiflorum* *All.* ped. t. 29, t. 2 et 3. *W. Kit.* pl. rar. t. 99. — *Bmg.* 1668. — *H. pappoleucum* *Vill.* — *H. conyzae-folium* *Gouan.*) — Auf bewachsenen Abhängen, Triften der Voralpen und Alpen: Fogaraser, Arpaser, Kerzesorer Alpen 5000'–6000'. Jul. Aug.

a. *simplex.* Caule simplici monocephalo, subhirsuto.

b. *oligocephala.* Caule superne 2–3 cephalo foliisque hirsuto. — Auf dem Arpás. Glimmerschiefer. Jul.

c. *corymboso montana.* Caule elato 2 ped. superne corymboso polycephalo. — Auf dem Butsets 4000'. Aug.

d. *glabrescens.* Caule oligocephalo, anthodiis foliisque demum omnino glabris. — Königstein bei Kronstadt, auf dem Ecsem-Teteje, Fogaraser Alpen. Jul. Aug.

2111. *C. blattarioides* *Vill.* *delph.* 3, 136. — (*C. austriaca* *Jacq.* A. t. 441; *Jacq.* en. t. 5. — *C. sibirica* *Gouan.* ill. 60. [non *L.*] — *Hieracium blattarioides* *L.*; *Bmg.* 1660. — *H. pyrenaicum* *L.* *system. nat.* ed. 10, p. 1095, non *Rech.*) — Auf felsigen grasigen Abhängen der Voralpen und Alpen. (*Bmg.* l. c.) Jul. Aug.

a. *glabrescens amplexicaulis.* Caule pedali dense foliato, foliisque parce piloso demum glabro; pedunculis axillaribus monocephalis; foliis caulinis ovato-oblongis basi sagittata amplexicaulis, lobis rotundatis, foliisque callosodentatis, margine pilis brevibus ciliatis. Peranthodii foliolis exterioribus oblongis adpressis dorso margineque parce pilosis. Radice perenni multicipite. — (*C. amplexicaulis* *Schur* herb. *Transs.*) — An quelligen Orten des Arpás. 5000'. Jul. Aug.

foliolis interioribus superficie glabris, a *C. virente* anthodiis majoribus habituque majori fructibus apice attenuatis 10 striatis, distincta (non basi apiceque aequaliter obtusis.) — Auf Aeckern und in Grasgärten, auf Luzernenfeldern und zwischen Klee bei Hermannstadt. Jul.

2117. *C. agrestis* *W. Kit.* pl. rar. t. 220; *Bmg.* 1677. — *Willd.* sp. 3, p. 1602. *Ledeb.* Ross. 2, 822. — (*C. neglecta* *M. Bieb.* casp. app. p. 210, non *L.*) — Auf Aeckern, Hügeln, bebauten und unbebauten Orten, gern auf Luzerne- und Kleefeldern. Hermannstadt. Jun. Aug.

2118. *C. tectorum* *L.* — *Bmg.* 1675. — *Fl. dan.* t. 501. — *Schkh.* t. 222. — (*C. murorum* *S. G. Gmel.* — *C. Dioscorides* *Pall.* non *L.*) — Auf Triften, Wiesen, Aeckern, Mauern, Dächern, auf bebautem und unbebautem Boden, in Form und Grösse höchst veränderlich. (*C. polymorpha* *Schur* herb.) Hermannstadt. Jun. Aug.

a. *minima*. Caule gracillimo prostrato suberectove, 6—8 poll. interdum a basi ramoso glabro; foliis radicalibus oblongo-spathulatis, integerrimis vel sinuato-dentatis glaberrimis vel margine parce pilosis; fol. summis linearibus integerrimis. Anthodiis minimis glabriusculis, longissime pedunculatis in paniculam subcorymbosam oligocephalam dispositis; peranthodii foliolis viridibus tenue canescentibus vel glabris vel nigro-viridibus dorso setulosis. (*C. tectorum* β *segetalis* *Roth.* fl. germ. 2, 254; *Ledeb.* Ross. 2, 823; *Bmg.* l. c. var. a. — *C. Lachenalii* *Gochn.* t. 3, non *Gmel.* *C. tectorum* var. γ *melanocephala* *Ledeb.* l. c.; *C. angustifolia.*) *d'Urvill.* — Auf alten Strohdächern und Brachäckern bei Hermannstadt. Jun. Aug.

2119. *C. campestris* *Schur* herb. Transs. Omnibus in partibus major quam *C. tectorum* et *C. agrestis* et plus minusve scaber. Caule 1—2 ped. et ultra, a medio ramoso, ramis erectis corymbosis. Foliis radicalibus runcinato-pinnatifidis; superioribus runcinato-dentatis; summis linearibus integerrimis; omnibus scabris. Anthodiis numerosissimis, duplo majoribus quam *C. tectorum*; peranthodii foliolis canescentibus dorso setoso-hispidis, setis nigris glanduliferis. Fructibus fuscis, apice attenuatis setulis antrorsum versis hispidis. — Auf Aeckern zwischen Klee und Luzerne bei Kronstadt. Jun. Aug.

2120. *C. virens.* *Vill.* delph. 3, 142. — *Bmg.* 1678. — (*C. pinnatifida* *Willd.* — *C. polymorpha* *DC.*) — Auf grasigen Hügeln, Aeckern, Triften, Hermannstadt, Kronstadt auf Kalkkonglomerat. Jun. August.

466. GERACIUM *Rehb.* exc. germ. p. 259.

(*Crepidis* species *L. Koch* et alior.)

2121. *G. chondrilloides* *Rehb.* l. c. n. 1711. — (*Hieracium chondrilloides* *L.*; *Bmg.* 1650; *Jacq.* en. t. 7; *Jacq.* A. t. 429. — *Sturm.* H. 39. [non *Vill.*] *Crepis* *Jacquini* *Tausch.* bot. Zeit. 2, 1, p. 79. — *Koch* syn. 2, 506.) — Auf Felsen und steinigen Abhängen der Kalkalpen, Butsets, Königstein; sehr schön auf dem Eesem-Teteje bei Sz. Domokos. 5000'—6000'. Jul. Aug.