

ex alveolarum margine orientibus, villosum. Achænia difformia, radialis involuci squamis naviculæribus subinvoluta, persistentia, suberostria, pappo pl. breviore ac in achæniis disci munito et hinc inter Crepides simili se habens modo, ac Medicusia Mœnch inter Picrides, reliqua articulate cum receptaculo juncta longe rostrata.

HERBÆ annuae, graveolentes, europæo-mediterraneæ.

OBS. Wibeliae synonyma sunt : Hostia Mœnch, Meth. suppl., p. 221 (an. 1802); Cass., Dict., 21, p. 442. — Dysodea Borkhausen, Tentati. dispos. plant. German., p. 198 (1809). — Anisoderis Cass., Dict., 48, p. 429 (an. 1827); DC., Prodr., 7, p. 157 excl. Barkhausia Link, Enum. II. berol., p. 290. Crepideas diversissimas amplectens et tantum ex parte hic spectans.

OBS. Duæ hujus subgeneris species hucusque in Canariis observatæ : Crepis fœtida Linn., et Cr. juvenalis Fr. Guil. Schultz, quarum noæ essentiales analysi sequente illustrandæ. Rostrum piliforme gracilis adhuc est quam rostrum filiforme.

DIVISIO I. EUWIBELIA. SCHULTZ BIP.

Wibelia Fl. Wetter. I. c. Capitula ante anthesin nutantia.

1. Crepis rubra Linn. Achænia sensim in rostrum filiforme abeunt.
2. Crepis fœtida Linn. Achænia abrupte in rostrum piliforme attenuantur.

DIVISIO II. DELILEOCREPIS. SCHULTZ BIP. MS.

Sec. amiciss. acutiss. Delile, qui speciem primam hujus divisionis prope Monspelium lectam, publici fecit juris.

3. Crepis juvenalis Fr. Guil. Schultz. Achænia sensim in rostrum filiforme abeunt.
4. Crepis rodigioides C. H. Schultz Bip. Achænia abrupte in rostrum piliforme attenuantur.
5. Crepis Candollii C. H. Schultz Bip. Cf. infra obs. 3.

OBS. 1. Crepis rubra Linn., in pascuis et secus vias in regione crateris mediterranei boreali-orientali crescens, diagnosi sequente ab affini Cr. fœtida Linn., distinguenda :

Annua, capitulis ante anthesin nutantibus, achæniis sensim in rostrum robustum elongatum filiforme abeuntibus, periphericis vero suberostribus, foliolis involuci exterioribus ovato-lanceolatis, subacuminatis, margine scariosis, patentibus, floribus incarnatis.

OBS. 2. Crepis rodigioides C. H. Schultz Bipont. in Kotschy pl. alepp. ed. cl. Hohenaker n. 178.

Cr. annua, capitulis semper erectis, demum ovalis, achæniis abrupte in rostrum piliforme abeuntibus elongatum, periphericis vero suberostribus, foliolis involuci extornis linear-lanceolatis glabriusculis adpressis, internis farinaceo-pubescentibus inferne quandoque pilis parce obsitis glanduliferis. (Habitus Rodigiae commutatae Spr., sed glabrescens, receptaculum opaleatum, involucrum subfarinaceum non setosum, capitula semper erecta.)

Var. 1. Kotschiæna, caule spithameo, dichotome ramoso, foliis subhirtis, dentato-pinnatifido-laceris, rameis nunculato-sagittatis, pedunculis elongatis. — In graminosis et lapicidinis pr. Aleppum, 50 Aprili : Kotschy pr. Brussa : Thirkel pl. Bithyn. pont. ed. C. Koch n. 50.

Var. II. Thirkiana, vix palmatis, foliis subintegratis, caulis pluribus, 1-cephalitis, capitulis minoribus : Thirk. Cum priore in pl. Bithyn. pont. n. 63, ed. C. Koch. an. 1845.

OBS. 3. Cum inscriptione : Crepis fœtida, pedunculis ante anthesin erectis anno 1843 ab amiciss. Bischoff plantam accepi e seminibus Barkhausie Candollii hort. halensis in horto Heidelbergensi enatam. Stirps pedalis cum forma Crepidis fœtidæ glandulosæ comparanda, sed ob capitula semper erecta certo certius distinctissima. = Crepis Candollii C. H. Schultz Bipont. forte tamen cum Barkhausia Candollii Spr. identica, licet cl. auctor plantam suam cum Crepide glandulosa Guss. jungat, quæ varietas Crepidis fœtidæ est.

