

Hab. in Rossia media [Volhynia (BESSER, EICHW.)] et australi [Kiew (TRAUTVETT. *in litt.*), Podolia (BESSER, EICHW.), pr. Astrachan! (BLUM *pl. exs.*)], in Tauria! (PALL., M. a BIEB.) et provinciis caucasicis (M. a BIEBERST.) [Ossetia (C. KOCH), Iberia! (WILHELMS *pl. exs.*), Mingrelia et Imeretia! (NORDMANN *pl. exs.*, C. KOCH), Somchetia! (EICHWALD), versus m. caspium (C. A. MEYER), pr. Lenkoran (HOHENACK.), in ins. Sara m. caspii! (KIESERITZKY *pl. exs.*)]. ☉.

*Crepis echioides* (LEDEB. *Ind. sem. h. dorpat.* 1821, p. 23), quam a. 1818 in Tauria ad monasterium St. Georgii fere defloratam legi, hujus videtur forma major et hirsutior, caule stricto, superne paniculato-subcorymboso.

5. *B. foetida* (DEC. *Fl. franc. IV*, p. 42) caule erecto foliato ramoso cum foliis hirsuto, foliis runcinato-pinnatifidis; summis lanceolatis basi profunde incisus, pedunculis ante anthesin nutantibus, involucri toto canescente villosa: pilis simplicibus glanduliferisque.

*Crepis foetida*. L. *Sp.* 1133.

*Anisoderis foetida*. FISCH. et MEYER *Ind. IV. sem. h. petropol.* p. 32.

β. foliis minus divisus. FISCH. et MEYER l. c.

*Barkhansia Candollei*. SPRENG. *Syst. veg. III*, p. 652 (ex FISCH. et MEYER).

*Barkhansia Candollei*. DEC. *Prodr. VII*, p. 158.

*Barkhansia glandulosa*. DEC. *Prodr. VII*, p. 158.

*Crepis glandulosa*. AUCT. (ex FISCH. et MEYER).

Hab. in Rossia australi [circa Odessa (BESSER ex DEC.)]. ☉.

## 592. *Crepis*. L. (excl. spec.).

DEC. *Prodr. VII*, p. 160. — ENDLICHER *gen.* p. 500. — MEISNER *gen.* p. 236. — *Comment.* p. 144.

Capitulum multiflorum. Involucrum duplex; interius uniseriale; exterius breve calyculiforme v. subimbricatum. Receptaculum epaleatum. Achenia teretiuscula, exalata, sensim in rostrum breve attenuata. Pappus pilosus, albus, mollis, multiserialis.

Sect. I. *Phaeccasium*. REICHENB. *Fl. exc.* p. 257. —  
DEC. *Prodr. VII*, p. 160.

Capitulum pauciflorum. Involucri squamae exteriores adpressae.

1. *C. pulchra* (L. *Sp.* 1134) caule erecto basi simplici apice laxo paniculato, foliis radicalibus dentatis runcinatisve basi attenuatis; caulinis ovato-lanceolatis basi sagittatis dentatis integrisve, involucri cylindraco, squamis exterioribus paucis acutis brevibus margine scariosis.

*C. pulchra*. DEC. *Prodr. VII*, p. 160. — M. a BIEB. *Fl. t. c. II*, p. 259. —

C. A. MEYER *Ind. cauc.* p. 58. — HOHENACK. *Enum. Talüs.* p. 41.

*Chondrilla pulchra*. LAM. *Encycl. méth. II*, p. 77.

*Prenanthes paniculata*. MÖNCH *Meth.* p. 534.

*Prenanthes hieracifolia*. WILLD. *Spec. pl. III*, p. 1541.

*Prenanthes pulchra*. DEC. *Fl. franc. IV*, p. 7.

*Prenanthes viscosa*. BAUMGART. *Fl. transylv. III*, p. 44.

*Intybellia pulchra*. MONN. *Ess.* p. 79.

*Phaeccasium lampanoides*. CASSINI *in Dict. sc. nat. XXXIX*, p. 387.

*Lampana pulchra*. VILLARS *dauph. III*, p. 163.

*Sclerophyllum pulchrum*. GAUD. *Fl. helv. V*, p. 48.

*Hieracium pulchrum*. J. BAUH. *Hist. II*, p. 1025.

Sect. V. *Hieracioides*. — (Haplostaphium et Hieracioides.) DEC.  
*Prodr. VII*, p. 165. 167.

Involucrum pluriseriale, imbricatum.

13. *C. oreades* (SCHRENK *Enum. pl. nov. II*, p. 32) scapis subaphyllis simplicibus v. ramosis, foliis subvillosis v. glabriusculis oblongis runcinato-pinnatifidis v. dentatis in petiolum attenuatis; caulinis paucis sessilibus v. nullis; supremo lineari-subulato, involucri squamis subimbricatis (plerumque) tomento tenui arachnoideo albo adspersis praesertim ad carinam nigro-setosis; exterioribus linearibus patulis.

*α. cinerascens* (SCHRENK l. c.) scapo simplici v. ramoso, foliis plerisque runcinato-pinnatifidis subcanescentibus.

*β. simplex* (SCHRENK l. c.) scapo simplicissimo monocephalo, foliis subvillosis v. glabriusculis dentatis runcinatisve v. integerrimis.

Hab. in Sibiriae altaicae deserto soongoro-kirghisico in m. Alatau! et Tarbagatai! (SCHRENK). 4.

14. *C. chrysantha* (TURCZ. *Cat. Baikal. Nr. 710*) caule erecto 1- (rarius 2-) cephalo 2—3phyllo apice cum involuero villo albo raro adperso et pilis longis nigricantibus hirsuto, foliis obovato-oblongis dentatis glabris v. parce albo-villosis; summo sublineari; involucri turbinati squamis exterioribus subelongatis patulis.

*C. chrysantha*. FRÖL. in DEC. *Prodr. VII*, p. 165.

*Hieracium chrysanthum*. LEDEB. *Fl. alt. IV*, p. 129. — Ej.  *Ic. pl. Fl. ross.* t. 456. — BUNGE *Enum. alt.* p. 80.

*Hieracium alpinum*. PALL. *It. III*, p. 445? — GEORGI *It. I*, p. 228. — Ej. *Beschreib. d. Russ. R. III*, 4. p. 1211; *Nachtr.* p. 305?

*β. tubaeformis*: pedunculo versus apicem subincrassato, foliis plerumque profundius dentatis.

*Hieracium frigidum*. TURCZ. *pl. exs. 1829*. — STEVEN in litt. ex DEC. l. c.

*γ. minor*: caule monocephalo 1—2folio, foliis radicalibus runcinato-subpinnatifidis v. dentatis; caulinis dentatis v. integerrimis.

*Hieracium polytrichum β. dentatum*. BUNGE *Enum. alt.* p. 80.

*Apargia crocea*. LESSING in herb. reg. berol?

Subsequenti et quidem varietati *β.* subsimilis, sed involucri forma et indumento bene distincta et huic speciei subjungenda.

Hab. in Rossia arctica [territor. Samojarum reg. subarct. et arct. (SCHRENK in litt.)] inque Sibiria altaica! (FL. ALT., SIEVERS ex GEORGI), in m. ssabinensibus! (LESSING in herb. reg. berol.) et baikalensi in alpinis Schibet! et Urgudei! (TURCZ., SCHTSCHUKIN *pl. exs.*), Davuria? (PALL.);

*β.* in Sibiria baikalensi;

*γ.* in Sibiria uralensi in m. Iremel! (LESSING) et altaica ad fontem fl. Tscharysch. 4.

15. *C. polytricha* (TURCZ. *Cat. Baikal. Nr. 712*) caule erecto simplici v. ramoso mono- v. oligocephalo uni- v. paucifolio superne cum involuero pilis longissimis patentissimis mollibus flavescens den- sissime oblecto inferne lanuginoso, foliis plus minus piloso-villosis; radicalibus oblongis in petiolum attenuatis subruncinato-pinnatifidis; caulinis omnibus v. inferioribus pinnatifidis; supremo subintegerrimo, involuero ob squamas patulas apice incurvatas ventricosas.

*α. legitima*: caule erecto plerumque ramoso oligocephalo paucifolio, foliis radicalibus pinnatifidis; caulinis inferioribus pinnatifidis; supremo subintegerrimo.