

Hab. in Rossia media [Volhynia (BESSER, EICHW.)] et australi [Kiew (TRAUTVETT. in litt.), Podolia (BESSER, EICHW.), pr. Astrachan! (BLUM pl. exs.)], in Tauria! (PALL., M. a BIEB.) et provinciis caucasicis (M. a BIEBERST.) [Ossetia (C. KOCH), Iberia! (WILHELM pl. exs.), Mingrelia et Imeretia! (NORDMANN pl. exs., C. KOCH), Somchetia! (EICHWALD), versus m. caspium (C. A. MEYER), pr. Lenkoran (HOHENACK.), in ins. Sara m. caspii! (KIESERITZKY pl. exs.)]. ⊙.

Crepis echiooides (LEDEB. *Ind. sem. h. dorpat.* 1821, p. 23), quam a. 1818 in Tauria ad monasterium St. Georgii fere defloratam legi, hujus videtur forma major et hirsutior, caule stricto, superne paniculato-subcorymboso.

5. **B. foetida** (DEC. *Fl. franc.* IV, p. 42) caule erecto foliato ramoso cum foliis hirsuto, foliis runcinato-pinnatifidis; summis lanceolatis basi profunde incisis, pedunculis ante anthesin nutantibus, involuero toto canescente villoso: pilis simplicibus glanduliferisque.

Crepis foetida. L. SP. 1133.

Anisoderis foetida. FISCH. et MEYER *Ind. IV. sem. h. petropol.* p. 32.

B. foliis minus divisis. FISCH. et MEYER l. c.

Barkhansia Candollei. SPRENG. *Syst. veg.* III, p. 652 (ex FISCH. et MEYER).

Barkhansia Candollei. DEC. *Prodr.* VII, p. 158.

Barkhansia glandulosa. DEC. *Prodr.* VII, p. 158.

Crepis glandulosa. AUCT. (ex FISCH. et MEYER).

Hab. in Rossia australi [circa Odessa (BESSER ex DEC.)]. ⊙.

592. Crepis. L. (excl. spec.).

DEC. *Prodr.* VII, p. 160. — ENDLICHER *gen.* p. 500. — MEISNER *gen.* p. 236. — *Comment.* p. 144.

Capitulum multiflorum. Involucrum duplex; interius uniseriale; exterius breve calyculiforme v. subimbricatum. Receptaculum epaleatum. Achenia teretiuscula, exalata, sensim in rostrum breve attenuata. Pappus pilosus, albus, mollis, multiserialis.

Sect. I. Phaeasium. REICHENB. *Fl. exc.* p. 257. —
DEC. *Prodr.* VII, p. 160.

Capitulum pauciflorum. Involuci squamae extiores adpressae.

1. **C. pulchra** (L. SP. 1134) caule erecto basi simplici apice laxe paniculato, foliis radicalibus dentatis runcinatisve basi attenuatis; caulinis ovato-lanceolatis basi sagittatis dentatis integrisve, involuero cylindraceo, squamis exterioribus paucis acutis brevibus margine scariosis.

C. pulchra. DEC. *Prodr.* VII, p. 160. — M. a BIEB. *Fl. t. c. II,* p. 259. —

C. A. MEYER *Ind. cauc.* p. 58. — HOHENACK. *Enum. Talüsch.* p. 41.

Chondrilla pulchra. LAM. *Encycl. méth.* II, p. 77.

Prenanthes paniculata. MÖNCH *Meth.* p. 534.

Prenanthes hieracifolia. WILLD. *Spec. pl.* III, p. 1541.

Prenanthes pulchra. DEC. *Fl. franc.* IV, p. 7.

Prenanthes viscosa. BAUMGART. *Fl. transylv.* III, p. 44.

Intybellia pulchra. MONN. *Ess.* p. 79.

Phaeasium lampsanoides. CASSINI in *Dict. sc. nat.* XXXIX, p. 387.

Lampsana pulchra. VILLARS *dauph.* III, p. 163.

Sclerophyllum pulchrum. GAUD. *Fl. helv.* V, p. 48.

Hieracium pulchrum. J. BAUH. *Hist.* II, p. 1025.

Sect. V. Hieracioides. — (Hapolostaphium et Hieracioides.) DEC.
Prodr. VII, p. 165. 167.

Involucrum pluriseriale, imbricatum.

13. *C. oreades* (SCHRENK *Enum. pl. nov. II*, p. 32) scapis subaphyllis simplicibus v. ramosis, foliis subvillosis v. glabriusculis oblongis runcinato-pinnatifidis v. dentatis in petiolum attenuatis; caulinis paucis sessilibus v. nullis; supremo linearis-subulato, involueri squamis subimbricatis (plerumque) tomento tenui arachnoideo albo adspersis praesertim ad carinam nigro-setosis; exterioribus linearibus patulis.

a. cinerascens (SCHRENK l. c.) scapo simplici v. ramoso, foliis plerisque runcinato-pinnatifidis subcanescens.

β. simplex (SCHRENK l. c.) scapo simplicissimo monocephalo, foliis subvillosis v. glabriusculis dentatis runcinatis v. integerrimis.

Hab. in Sibiriae altaicae deserto soongoro-kirghisico in m. Alatau! et Tarbagatai! (SCHRENK). 4.

14. *C. chrysantha* (TURCZ. *Cat. Baikal.* Nr. 710) caule erecto 1- (rarius 2-) cephalo 2—3phyllo apice cum involuero villo albo raro adsperso et pilis longis nigricantibus hirsuto, foliis obovato-oblongis dentatis glabris v. parce albo-villosis; summo sublineari; involueri turbinati squamis exterioribus subelongatis patulis.

C. chrysantha. FRÖL. in DEC. *Prodr. VII*, p. 165.

Hieracium chrysanthum. LEDEB. *Fl. alt. IV*, p. 129. — Ej. *Ic. pl. Fl. ross.* t. 456. — BUNGE *Enum. alt.* p. 80.

Hieracium alpinum. PALL. *It. III*, p. 445? — GEORGI *It. I*, p. 228. — Ej. *Beschreib. d. Russ. R. III*, 4. p. 1211; *Nachtr.* p. 305?

β. tubaeformis: pedunculo versus apicem subincrassato, foliis plerumque profundius dentatis.

Hieracium frigidum. TURCZ. *pl. exs. 1829.* — STEVEN *in litt.* ex DEC. l. c.

γ. minor: caule monocephalo 1—2folio, foliis radicalibus runcinato-subpinnatifidis v. dentatis; caulinis dentatis v. integerrimis.

Hieracium polytrichum β. dentatum. BUNGE *Enum. alt.* p. 80.

Apargia crocea. LESSING *in herb. reg. berol?*

Subsequenti et quidem varietati *β. subsimilis*, sed involueri forma et indumento bene distincta et huic speciei subjungenda.

Hab. in Rossia arctica [territor. Samojedarum reg. subarct. et arct. (SCHRENK *in litt.*)] inque Sibiria altaica! (FL. ALT., STEVERS ex GEORGI), in m. ssabinensis! (LESSING *in herb. reg. berol.*) et baikalensi in alpibus Schibet! et Urgudei! (TURCZ., SCHTSCHUKIN *pl. exs.*), Davuria? (PALL.);

β. in Sibiria baikalensi;

γ. in Sibiria uralensi in m. Iremel! (LESSING) et altaica ad fontem fl. Tscharysch. 4.

15. *C. polytricha* (TURCZ. *Cat. Baikal.* Nr. 712) caule erecto simplici v. ramoso mono- v. oligocephalo uni- v. paucifolio superne cum involuero pilis longissimis patentissimis mollibus flavescentibus densissime obtecto inferne lanuginoso, foliis plus minus piloso-villosis; radicalibus oblongis in petiolum attenuatis subruncinato-pinnatifidis; caulinis omnibus v. inferioribus pinnatifidis; supremo subintegerrimo, involuero ob squamas patulas apice incurvatas ventricoso.

a. legitima: caule erecto plerumque ramoso oligocephalo paucifolio, foliis radicalibus pinnatifidis; caulinis inferioribus pinnatifidis; supremo subintegerrimo.