

Hab. in *Galliâ occidentali* — *Vendée* : *Luçon* (abbé Guinand).

Foliorum et bracteis floriferis forma a sequentibus conspicue diversa, omnes ad gregem *C. pulchræ* L. sp. 1134, spectantes.

6. ***Crepis trichosticta***, Gdgr.

Caulibus omnino valde glanduloso-hirtellis ; foliis oblongis apice parùm attenuatis, basi attenuatis, amplexicaulibus villosis, saturate virentibus, serratis haud runcinatis, 21-24 mill. latis ; foliorum auriculis erectis, triangulari-acutis.

Hab. in *Pedemontio* ; *Vallée d'Aoste* (*Thomas*, plant. exsicc.)

7. ***Crepis Vendeana***, Gdgr.

Caule ad  $\frac{1}{4}$  part. infer. villosa, superne glabra ; foliis anguste oblongo-lanceolatis sat acutis, basi paulo attenuatis, villosis, amœne virentibus, 11-13 mill. latis, subintegerrimis, amplexicaulibus ; auriculis vix perspicuis, subrotundatis.

Hab. in *Galliâ occidentali*. — *Vendée* ; *Luçon* (abb. Guinand.).

A præcedente foliis duplo angustioribus acutioribusque, habitu magis rigido etc., differt.

8. ***Crepis cichoroides***, Gdgr.

Caule usque ad dimidiam infer., partem villosa ; foliis late oblongis, apice attenuato-obtusiusculis, basi attenuatis, pubescentibus, pallide viridibus, 20-23 mill. latis, inferioribus mediisque caulinis runcinato-pinnatifidis, superioribus autem valde dentatis, sessilibus, haud aut vix amplexicaulibus ; auriculis nullis.

Hab. in sabulosis *Delphinatus* circa *Grenoble* (*Chavanis ! Cornet ! Verlot ! David ! Chabert !* etc. et ipse).

A tribus præcedentibus habitu ramosiore, magis etiam rigido, foliis lyrato-piunatifidis nec auriculatis, valde distincta.

### 9. **Crepis Deloyni**, Gdgr.

Caule usque ad partem dimidiam inferiorem hirsuto; foliis oblongo-obtusis, basi attenuatis, sessilibus, haud amplexicaulibus, parce inciso-piunatifidis, villosis, 16-18 mill. latis, pallide virentibus, superioribus subdentatis, lanceolatis.

Hab. in *Galliâ occidentali*: ad colles *Pont-Achard* prope *Poitiers* (P. Deloynes).

Præcedenti valde accedere videtur, sed foliis paulo angustioribus, basi minus runcinatis, superioribus præsertim lanceolato-acutis, discedit.

### 10. **Iris polychroa**, Gdgr.

Caule oblique ascendente, 5-7 decim. alto, plurifloro (4-5), foliis longiore, basi ut et foliis inferioribus ac radicalibus ex rubro-violaceo tincto; foliis ensiformibus, intense virenti-subglaucescentibus, 2 2 1/2 cent. latis, caulinis mediis falcatis; spathæ sat ventricosæ apiceque attenuatæ, valvis scariosis margine violaceis, apice acutis; pedunculis 3 mill. longis, ovario triplo brevioribus; ovario 9-10 mill. longo quadragulato-rotundato, angulis obtusissimis; tubo perianthi 12 mill. longo, ovario sublongiore, omnino spathâ tecto; segmentis exterioribus deflexis, oblongo-spathulatis, basi paulatim attenuatis, apice late rotundatis, sat emarginatis, margine planis vel supra subrevolutis, pilis aurantiacis; segmentis interioribus erectis, basi valde crispo-undulatis, subitoque contractis, apice late elliptico-oblongis, emarginatis, extus haud venosis, apice livide pallideque violaceo-lutescentibus, basi vero livide luteo-violaceis, intus ad unguem bruneopunctatis; stigmatibus oblongis, livide luteis, 2/3 sup. segmenta-