

- Cirsium decussatum* Janka, na pustych miejscach na Czerniańskim wierzchu koło Słobody Rungurskiej, zapewne i *Cirsium eriophorum* podawane z Karpat tu należy.
- C. palustre* Scop., *C. rivulare* i *C. oleraceum* Scop., na łąkach mokrych wszędzie pospolite.
- C. pauciflorum* Sprgl., wszędzie nad potokami i na mokrych miejscach na połoninach od przeszło 1000 metrów aż do krainy kosodrzewu, lecz zwykle nie w większej ilości; niekiedy schodzi i niżej np. nad potokiem Chrepełowym.
- Aposeris foetida* Less., w lasach górskich, koło Osław, nawet i w krainie kosodrzewu np. na Sywuli.
- Lappa tomentosa* Lam. i *L. officinalis* All., koło Zielonej na pustych miejscach.
- Serratula tinctoria* L., na łąkach w Osławach.
- Cichorium Intybus* L., w ogrodach i koło dróg w Osławach.
- Hypochaeris maculata* L., na Jaworowej i Pantyrze koło Osław.
- H. uniflora* Vill. Nie tylko na połoninach bardzo obficie, lecz też i na łąkach np. koło Zielonej.
- Leontodon hastilis* L., na Jaworowej, Pantyrze koło Osław, w Pasiecznej.
- L. hispidus* L. na Kukule, Doboszance, Bratkowskiej i Stanimirze.
- L. pyrenaicus* Goüan., w krainie kosodrzewu na Bratkowskiej.
- Tragopogon pratensis* L., na łąkach w Pasiecznej.
- Scorzonera rosea* W. K., na wszystkich połoninach od 1000 m. obficie, również w krainie kosodrzewu, lecz nieco rzadziej, np. na Sywuli, Howerli, Bratkowskiej.
- Sonchus arvensis* L., na polach w Osławach.
- Prenanthes purpurea* L., na Jaworowej, na Rypnej koło Zielonej.
- Lactuca muralis* L., w lasach koło Osław.
- Taraxacum officinale* v. *alpinum* Koch., w krainie kosodrzewu na Sywuli i Howerli.
- Crepis biennis* L., na połoninach i brzegach lasów na Jaworowej, Pantyrze, również na łąkach koło Zielonej.
- C. paludosa* Münch., na mokrych miejscach koło Osław i Zielonej obficie.

Crepis confusa m.

Caulibus adscendentibus ad 30 cm. altis, sulcatis, imprimis ad basim hirsutis, corymbosis, 1—7 cephalis, sub capitulis plus minus incrassatis; foliis radicalibus oblongo-lanceolatis, sinuato-dentatis, sessilibus; superioribus sagittato-amplexicaulibus, minus dentatis vel integris; capitulis magnitudine C. grandiflorae vel paulum minoribus; involucri foliolis nigricantibus oblongo-lanceolatis, hirsutis sicut et caulis nunquam glandulosus, interioribus obtusis, exterioribus dimidio brevioribus acutis; floribus

aureis, acheniis 12 striatis (?), *pappo niveo.*

In pratis montanis et subalpinis Carpathorum orientaliu vulgata. Huc referenda C. grandiflora Aut. Gal.

Do *C. grandiflora* bardzo podobna, rozróżnić ją jednak można natychmiast od niej zupełnym brakiem gruczołków, nadto zdaje mi się, że owocki posiadają tylko 12 lub 13 żeberek, czego nie mogłem sprawdzić, ponieważ owocków dojrzalszych nie mam a żeberka ich wszystkie razem się nie wytwarzają. *C. grandiflora* posiada ich 20.

Hieracium Pilosella L., na połoninach na Jaworowej, na Pantyrze, Stanimirze, Kukule.

H. auricula × *Pilosella*, na Pantyrze i Kukule.

H. polonicum Błocki in lit. *differt a Hieracio pratensi capitulis minoribus, pilis caulinis dimidio brevioribus, flagellis crebrioribus adscendentibus florigeris robustioribus et stolonibus tenuioribus sat copiosis.*

In Galicia orientali vulgare in montanis montium Jaworowa, Pantyr prope Osławy.

H. roxolanicum Rehm. (?) na Kukule.

Hieracium Błockii m.

(*Hieracium aurantiaco* × *polonicum*).

Rhizoma breve, obliquum; caulis ad 70 cm. altus, flagelliferus, flagellis adscendentibus vel erectis, caulem primarium imitantibus, florigeris, copiosis, 2—3 phyllus, sicuti flagella pilis horizontalibus diametro caulis dimidio brevioribus, apicem versus rarescentibus floccoque stellato sparso instructus, apice corymbosus, polycephalus; folia basalia obverse lanceolata, superiora lanceolata, sessilia, in utraque pagina pilis mediocribus, sparsis, subtus in nervo albido crebrioribus obsita, indumento stellato carentia; caulis pars suprema sicuti pedunculi et involucri flocco stellato setisque glanduligeris eglandulosisque praedita; involucri 7 mm. longa, 4 mm. lata, foliolis lanceolatis, nigricantibus, acutiusculis; flores pallide aurantiaci.

Differt a H. aurantiaco pilis caulinis brevioribus, capitulis minoribus, floribus pallidibus; a H. polonico imprimis rhizomate abbreviato, stolonibus subnullis, capitulis majoribus, floribus pallide aurantiacis.

In Carpathorum orientaliu monte Jaworowa prope Osławy in consortio H. aurantiaci et H. polonici.

H. aurantiacum L., na Jaworowej, Pantyrze, Rokiecie, w ogóle na wszystkich górach zwiedzonych.

H. alpinum L., wszędzie w krainie kosodrzewu i na Stanimirze. P. REHMANN pisze w: *Diagn. d. in Gal. u. i. d. Buk. beob.* Hier., że gruczołków na tem *H. nigdy* nie widział. Dziwi