

61. H. BIENNE: caule erecto ramiolo sulcato, foliis runcinato-pinnatifidis, summis lanceolatis dentatis, calycibus muricato-tomentosis. — *Crep. bienn. Lins.*

*Hab. in agris Eur. ♂. D.*

918. CREPIS.

1. C. NEMAUSENSIS: foliis runcinato-lyratis obtusis dentatis, scapo nudo multifloro hispido, calycinis squamis margine membranaceis. *W. Sp.*

*Hab. in Europ. austr., Palæstin. ♂. D. intr. 1798.*

2. C. LEONTODONTOIDES: foliis runcinatis dentatis glabris, scapo nudo multifloro adscendente, calycibus tomentosis: squamis exterioribus adpressis. *W. Sp.*

*Hab. in sylv. Pedemont. ♂. D. intr. 1805.*

3. C. INTYBACEA: foliis inferioribus runcinato-pinnatifidis, summis integerrimis, ramis nudis subdivisis subtrifloris; calycibus pubescentibus, costa media squamarum setosa, caule erecto sulcato. *W. E.*

*Hab. in Lusitania. ♂. D. F. intr. 1811.*

4. C. VESICARIA: foliis ovato-oblongis runcinato-dentatis hirtis, caule basi sulcato, floribus corymbosis, bracteis calycinisque squamis exterioribus membranaceis scariosis. *W. Sp.*

*Hab. in Creta. ♀. F. intr. 1812.*

5. C. TAURINENSIS: foliis scabris, radicalibus lyrato-runcinatis, caulinis lanceolatis amplexicaulibus basi dentatis, calycibus subtomentosis: squamis exterioribus margine membranaceis. *W. Sp.*

*Hab. in collib. Taurinens. ♂. D. F. intr. 1808.*

6. C. ALPINA: foliis ovatis cordato-sagittatis amplexicaulibus dentatis, pedunculis elongatis, floribus calycibus hispidis, exterioribus membranaceis scariosis. *W. Sp.*

*Hab. in alpib. Ital., Sibir. ♂. D. An hujus generis?*

7. C. ALBIDA: foliis cano-scabris, radicalibus runcinato-dentatis, caulinis oblongo-lanceolatis amplexicaulibus subdentatis, calycinis squamis margine membranaceis ciliatis. *W. Sp.*

*Hab. in Eur. austr. 24. D. intr. 1807.*

8. C. RIGIDA: foliis rigidis scabris dentatis, radicalibus obovatis, caulinis sagittatis amplexicaulibus, floribus racemoso-paniculatis, calycibus pubescentibus. *W. Sp.*

*Hab. in Hungar., Tauria. 24. D. intr. 1800.*

9. C. CORIACEA mihi: foliis lanceolatis dentatis rigidis glabris, superioribus linearibus integerrimis, caule paniculato, pedunculis inferioribus longioribus.

*Hab. — — ♂. ○. F. intr. 1811.*

10. C. RUBRA: foliis radicalibus runcinato-lyratis, caulinis amplexicaulibus lanceolatis, inferioribus pinnatifidis, calycibus hispidis, squamis exterioribus scariosis. *W. Sp.*

*Hab. in Apulia. ○. D.*

11. C. FOETIDA: foliis runcinato-pinnatifidis scabris sessilibus, summis lanceolatis basi profunde incisis, calycibus ovatis pilosis angulatis. *W. Sp.*

*Hab. in Germ., Eur. austr. ○. D. intr. 1796.*

12. C. SPRENGERIANA: hispido-scabra, foliis oblongis amplexicaulibus remote dentatis, caule divaricato-ramoso, squamis calycinis exterioribus inæqualibus patulis. *W. Sp.*

*Hab. in Lusitan., Italia. ○. D.*

13. C. ASPERA: foliis amplexicaulibus, inferioribus oblongis dentatis, superioribus inciso-dentatis, caule setoso-hispido, calycibus fructigeris angulatis muricatis: squamis exterioribus membranaceis. *W. Sp.*

*Hab. in Sicil., Oriente. ○. D.*

14. C. LAPPACEA: foliis sessilibus hispidis oblongis sinuato-dentatis, caule hispido, ramis i-floris,