

Pacific Exploring Expédition, en mélange avec *Lactuca versicolor* Sch.-Bip. in herb. Mus. Paris.

Cette espèce ne figure ni dans le *Flora hongkongensis* de Bentham, ni dans le *Flora of Kwang-tung and Hong-kong* by Steph. Troyte Dunn and W. J. Tutcher in *Kew Bull. Addit.*, series X. Sans doute elle aura été confondue avec des Composées très ressemblantes, comme *Lactuca versicolor* Sch.-Bip. ou bien elle y est extrêmement rare et, a pu ainsi passer inaperçue. Elle a dû être propagée avec les graines qui accompagnent les semaines de riz. C'est dans les champs en friche qu'on la rencontre le plus souvent au Tonkin, bien qu'elle se trouve, au dire de Bon, n° 1 383, sur les pelouses sèches des montagnes.

Crepis Coronopus Gagnep., sp. n.

Herba perennans vel bima. Caules erecti, undulati, striato-sulcati. Folia radicalia multa, rosulanta, pinnatipartita, lobis alternis vel suboppositis, obovato-linearibus, obtusis vel obtusiusculis, remotis, infimis minoribus; petiolo angustissimo, basi amplectente; f. caulina conformia sed minus lobata, sessilia, amplectentia; f. suprema vix sinuata, linearilanceolata, basi hastata, auriculis dentatis. Inflorescentia terminalis, subsessilia, laterales superantia, omnia corymbosa, pluriflora; pedunculi capillares, capitulis majores; capitula cylindracea minuta; bracteis extimus 5, deltoideis, intimis circa 10, linearibus, breviter acuminatis, margine scariosis; flores usque 20. Pappus candidus, tenuis mollisque. Corollæ ligula truncata, 5-denticulata. Stamina 5; antheræ brunneæ, rotundato-apiculatae, basi auriculatae, auriculis subulatis. Ovarium infra apicem constrictum; stylus papillosus, cruribus 2, papillosum. Achænum late fusiforme, tenuiter rostratum, 10-costatum, costis subalatis. — Caules 10-30 cm. alti. Folia radicalia 10-15 cm. longa, lobis 1-2 cm. longis, terminale 2,5-4 cm. longum. Capitula 3 mm. lata, bracteis extimus 1 mm., intimis 5 mm. longis. Corollæ ligula 2 mm. longa. Antheræ 1 mm. longæ; styli crura 0,6-0,7 mm. longa. Achænum 4 mm. (rostro 1,5 mm.) longum.

TONKIN : Tu-phap, n° 3 061 (*Balansa*). — LAOS : Nong-kay, Kemmarat, Ubon, sans n° (*Thorel*).

Espèce très remarquable par la forme de ses feuilles radicales qui sont, plus en grand, celles du *Plantago Coronopus*. L'achaine est rostré finement et longuement, et les côtes de la partie fertile, presque aussi épaisses que larges, sont saillantes plus que dans la plupart des autres espèces.

Crepis tonkinensis Gagnep., sp. n.

Herba nana, perennans. Radix descendens, crassa. Folia omnia radicalia, numerosa, obovato-oblonga, apice obtusa vel rotunda, basi atte-