

Lapsana olympica (aff. *L. intermedia* M. B.).

Annua? foliis superioribus glabrescentibus, caulibus elatis glanduloso-pilosis dichotome et divaricatim corymbosis, foliis inferioribus lyrato-pinnatipartitis laciniis lateralibus oblongis dentatis vel integris, lacinia superiore triangulari-ovata grosse dentata apice acuta, superioribus oblongis linearibusque integris, flosculis aurantiacis, involuero livido vel parce ciliato pedunculo 2-plo vel pluries longiore aut æquilongo.

Regio montana ad *Buro*, *Andria* et in Olympo. — Vulgo Ἀγριο-λαφάνα.

Lasiospora eriolaena.

Differt a *L. lanata* et *tuberosa* caulibus simplicibus vel a basi ramosis, 1-2-3 cephalis capitulis longe pedunculatis mediocribus phyllis internis ab exterioribus distincte longioribus, flosculis concoloribus involuero longioribus.

Reg. inf. et mont. C.

Picridium lesbiacum (aff. *P. vulgari* Desf.).

Perenne, glaucum, collo squamoso, caule brevi monocephalo vel dichotome ramoso et tunc bicephalo ramis nudis squamis triangularibus albo marginatis vel rarius inferne foliosis, foliis radicalibus rosulatis linearibus vel late lineari-spathulatis basi attenuatis vel subattenuatis sublobatis vel sinuato lobatis margine undulato-crispo, pedunculis squamosis apice incrassatis, capitulis majusculis, involucri phyllis adpressis herbaceis albo-marginatis inferioribus cordato triangularibus acutis, ligulis exterioribus subtus lividis, achæniis brevibus columnari tetragonis 4 sulcatis costis grosse tuberculato dentatis, interioribus albis sublævibus elongatis. — CC.

Crepis costata (aff. *pulchræ* et *Kochianæ* Boiss.).

Caule a basi vel superne dichotomo corymboso glabro, inferne foliato superne nudo, foliis glabris, radicalibus elongato vel oblongo spathulatis in petiolum attenuatis dentatis vel runcinato pinnatifidis, caulinis sessilibus auriculatis sagittatisve amplexicaulibus, oblongis et linearibus runcinato dentatis vel integris auriculis laciniatis, ramis pedunculisque elongatis summis setis paucis glanduliferis obsitis, capitulis parvis oblongis, involucri phyllis externis brevissimis paucis tenuissime linearibus adpressis

internis linearibus dorso pubescentibus et setis glanduliferis intermixtis hispidis, fructiferis induratis costa spongioso-incrassata semicylindrica, achæniis 2-plo minoribus, apice brevissime attenuatis oblongo-linearibus curviusculis omnibus elevatim 5-costatis inter 4 costas tenuissime unilineatis percursis, achænia exteriora costis scabriusculis, interiora lævia, pappo molli tenuissimo albo, ligulis involuero sesquolongioribus.

C. in reg. *Malea*.

Campanula esculenta (aff. *C. lyrata* Lamk.).

Radice eduli simili *Raphano sativo*, caulibus erectis vel flexuosis simplicibus vel ramosis, floribus solitariis v. 1-3-nis, breviter pedicellatis, calycis dense strigosi lobis oblongo-lanceolatis apice angustatis subacutis tandem basi dilatatis, tubo dimidio brevioribus, appendicibus tubo 2 1/2-plo brevioribus, tandem accretis, corolla breviter hirsuta tubulosa in limbum erecto patulum sensim ampliata calycis laciniis plus 2-plo longiore, lobis acutiusculis, capsula turbinata valvulis 5 sursum reflexis dehiscens, seminibus angulatis. Foliis superioribus obtusis floribus roseis. Variat floribus albis.

Forma albiflora C. in reg. infer. et super. Radix edulis dulcis structura tenera, vulgò Ἀγριορεπανίδα.

Trochocodon (aff. TRACHELIO) **spicatus**.

Stylus apice clavatus breviter 3-fidus, ovarium triloculare loculis ∞ ovulatis. — Perenne, radice crassa, glaberrimum, caulibus striatis tenuiter virgatis simplicibus v. paniculato ramosis et tunc hoc modo postquam ab animalibus erosi sint, foliis omnibus radicalibus vel paulo supra basin sitis parce foliatis, radicalibus oblongis vel linearibus in petiolum attenuatis subintegris vel obsoleto repando undulatis, caulinis angustissime linearibus, inflorescentia spicata vel paniculato-racemosa, floribus fere sessilibus in bracteas minutas triangulares 1-4 confertis spicatim dispositis, floribus pentameris rarius exameris minutissimis, laciniis calycinis oblongis acutis, corollæ cyanæ rotatæ tubo brevi laciniis linearibus patulis calycis laciniis longioribus, filamentis a basi lanceolatis dilatatis ciliatis liberis, antheris liberis, stylo corollæ laciniis æquilongo vel sublongiore superne clavato, stigmatibus breviter 3-fidis, capsula...