

triplo breviori, involuci phyllis conniventibus linear-lanceolatis obtusiusculis brevissimè setulis albis nigrisque hirtellis, ligulis luteis concoloribus involucra paulo superantibus.

Hab. in arenosis *Arabiæ petreæ* Palæstinam versus. Legi Apr. 1846.

Folia 1-1 1/2 poll. longa, caules 3-4 pollicares, capitula illis Sp. præcedentis majora, involuci phylla 5 lin. circ. longa. A præcedenti distincta foliis abbreviatis, caulis ramosioribus apice glandulosis, involucro densiusculè hirto. Habitus *Lagoseridis Nemausensis*.

CREPIS CRETICA Boiss. (Sect. *Barckhausia*.)

Cr. annua breviter hirtula, foliis omnibus radicalibus obovatis obsoletè denticulatis vel pinnatifidis, caulis numerosis setaceo-filiformibus ascendentibus simplicibus vel parcè ramosis glabris, capitulis minimis longiusculè pedunculatis, involuci squamis accessoriis 3-4 brevissimis setaceis, phyllis glabris vel dorso setulosis fructiferis patulis subinduratis canaliculatis dorso obtuse carinatis, achenis oblongo-lanceolatis striatis apice in rostrum eis duplo brevius attenuatis, pappo valde deciduo achenio breviori.

Hab. in *Cretâ* undè retulit cl. Prof. Raulin.

Barckausia Cretica Boiss. in Raulin pl. Cret. exs.

Plantula 2-3 pollicaris, capitula eis *B. cernuæ* ferè minora, involuci phylla vix ultrà 2 lin, longa. A *B. cernuâ* achenis rostratis, a *B. leotodontoide* Rchb, foliis non elongatis, caulis brevissimis achenis dimidiò brevioribus distincta. *B. Suffreniana* rostro achenium æquanti, *B. bellidifolia* caulis crassioribus capitulis plus duplo majoribus differunt. Species ex duobus speciminibus tantum nota ulterius investiganda.

CREPIS SIEBERI Boiss. (Sect. *Eucrepis* DC.)

Cr. perennis, radicis præmorsæ fibris cylindricis tenuibus elongatis, collo lanâ rufescenti vestito, caule parcè pilosulo glabro superne laxè corymboso-paniculato, foliis teneris lætè virentibus sub lente secus costam densius in utrâque paginâ parcè setulosis radicalibus inferioribusque petiolatis interruptè lyrato-pinnatipartitis lobis lateribus numerosis a superioribus ovatis angulatis subretrorsis ad infimos triangulares sensim diminutis terminali majori basi truncato vel subcordato-ovato acutiusculo obsoletè dentato, folio caulino ad ramum in-