

63. (20-21). H. STERNBERGII *Hoppe*: caule folioso erecto ramoso; foliis radicalibus petiolatis lanceolato-oblongis integrerrimis, caulinis oblongis amplexicaulibus basi dentatis, calycibus hispidis.

*Hab.* in Germania austr. ? 24. D. intr. 1814.

67. (31-32). H. SYLVATICUM: caule erecto simplici, foliis oblongis villosis subdentatis, Horibus subpedunculatis. *W. Sp.*

*Hab.* in Europæ sylvaticis. 24. D. intr. 1814.

72. (40-41). H. HUMIFUSUM: caulis virgatis procumbentibus glabris; foliis lanceolatis acuminatis dentatis glaucis glabris, calycibus subpilosus. *Spreng.*

*Pug.* 2.

*Hab.* — — 24. D. intr. 1816.

66. (48-49). H. PROSTRATUM *Desf. Tabl.*: caule prostrato apice florifero, foliis lanceolatis remote dentatis lanatis.

*Hab.* — — 24. D. intr. 1813.

70. (51-52). H. INCANUM: caule erecto tomentoso, corymbo composito, foliis ovato-lanceolatis amplexicaulibus integris subundulatis incanis ciliatis. *Bieb. Cauc.*

*Hab.* in Caucaso. 24. D. intr. 1815.

### 918. CREPIS.

26. (3-4). C. TARAXACIPOLIA: foliis runcinato-pinnatifidis dentatis hispidis; scapis adscendentibus basi foliosis multifloris, calycibus tomentosis, squamis exterioribus patulis. *W. Sp.*

*Hab.* in arvis Barbaricæ. ♂. D. intr. 1814.

24. (23-6). C. CROATICA: foliis glabris, radicalibus oblongo-ovatis remote dentatis, superioribus linearilanceolatis sagittatis integrerrimis, caule calycibusque hispidis.

*Hab.* in Croatia. ♂. D. intr. 1817 ex horto Pestiano sub hoc nomine.

25. (7-8). C. ORANDIFLORA: foliis radicalibus oblongis denticulatis, caulinis inferioribus sessilibus oblon-