

63. (20-21). *H. STERNBERGII Hopp*: caule folioso erecto ramoso, foliis radicalibus petiolatis lanceolato-oblongis integerrimis, caulinis oblongis amplexicaulibus basi dentatis, calycibus hispidis.

Hab. in Germania austr.? 24. D. intr. 1814.

67. (31-32). *H. SYLVATICUM*: caule erecto simplici, foliis oblongis villosis subdentatis, Horibus subpedunculatis. *W. Sp.*

Hab. in Europæ sylvaticis. 24. D. intr. 1814.

72. (40-41). *H. HUMIFUSUM*: caulis virgatis procumbentibus glabris; foliis lanceolatis acuminatis dentatis glaucis glabris, calycibus subpilosus. *Spreng.*
Pug. 2.

Hab. — — 24. D. intr. 1816.

66. (48-49). *H. PROSTRATUM Desf. Tabl*: caule prostrato apice florifero, foliis lanceolatis remote dentatis lanatis.

Hab. — — 24. D. intr. 1813.

70. (51-52). *H. INCANUM*: caule erecto tomentoso, corymbo composito, foliis ovato-lanceolatis amplexicaulibus integris subundulatis incanis ciliatis. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Caucaso. 24. D. intr. 1815.

918. CREPIS.

26. (3-4). *C. TARAXACIFOLIA*: foliis runcinato-pinnatifidis dentatis hispidis, scapis adscendentibus basi foliosis multifloris, calycibus tomentosis, squamis exterioribus patulis. *W. Sp.*

Hab. in præris Barbariae. ♂. D. intr. 1814.

24. (23-6). *C. CROATICA*: foliis glabris, radicalibus oblongo-ovatis remote dentatis, superioribus linearilanceolatis sagittatis integerrimis, caule calycibus que hispidis.

Hab. in Croatia. ♂. D. intr. 1817 ex horto Pestiano sub hoc nomine.

25. (7-8). *C. GRANDIFLORA*: foliis radicalibus oblongis denticulatis, caulinis inferioribus sessilibus oblon-