

*ramosissimis ramis intricatis*, foliis parce asperis radicalibus lanceolatis in petiolum attenuatis pinnatipartitis lobis brevibus acutis triangularibus basi confluentibus, foliis caulinis ad dichotomias sitis linearilanceolatis, capitulis ad extremitatem peduncularum subnudorum post anthesin incrassatorum solitariis ovatis, calyculo phyllis 3-4 linearibus brevibus constanti, involuci foliolis adpressis oblongis *medio dorso nigrescentibus* utrinque *indumento niveo adpressissimo tomentellis*, floribus luteis subtus purpureis, acheniis aliis albidis subestriatis sterilibus, aliis oblongo cylindricis basi apiceque subattenuatis 10-12 striatis ad strias apicem versus scabriusculis, pappo niveo achenium aequanti.

Hab. in rupestribus et pascuis saxosis regionis superioris *Taygeti*, ubi Augusto et Septembri floret de Heldreich 1845.

Caespites vix semipedales e caulis patule ramosissimis rigidis crassiustculis subnudis formati, rami monocephali 2-3 pollices longi apice post anthesin incrassati, capitula magnitudinis eorum *C. tectorum* vel *Nicaeensis*. Species habitu et squamis involuci distinctissima prope *C. oporinoidem* collocanda, *Crepidia alpinae* Vill. quoque affinis.

**CREPIS CROCIFOLIA** Boiss. et Heldr. loc. cit. Febr. 1845. (Sect. *Eucrepidis* DC.)

*C. glaberrima*, rhizomate crasso multicauli nigro petiolis vetustis squamoso, foliis fere omnibus radicalibus glauco-caesiis integerrimis gramineis linearibus, infimis subspathulatis obtusiusculis, caeteris acutis, *caulinis paucis* anguste linearibus abbreviatis, caulis tenuibus erectis elongatis subsimplicibus parce foliosis, capitulis terminalibus longe pedunculatis obconicis abbreviatis paucifloris, involuci nigricantis albo tomentelli squamis infimis brevioribus triangularibus subpatulis caeteris linearibus, floribus flavis involuero duplo longioribus, acheniis pallidis glabris fere estriatis *apice paululum attenuatis*, pappo sordido eis breviori terminatis.

Hab. in regione excelsiori *Taygeti* locis *Choupata*, *Hagios*, *Paraskevy* dictis, ubi detexit cl. de Heldreich Julio et Augusto 1845.

Folia 2-3 pollicaria 1-2 lineas longa, caules graciles pedales. Simumilla habitu *Hieracio porrifolio* sed ab eo generice distincta acheniis apice attenuatis nec columnaribus et specificie colore nigrescenti, rhizomate crasso multicauli, caulis subsimplicibus etc. Species distinctissima.