

От близкого *Crepis sonchifolia* M. B. (Кавказ) отличается менее расчлененными листьями, более тонкими цветоносами и стеблями, длинноресничатым цветоложем.

Crepis darvazica H. Krasch. sp. n. (sect. *Eucrepis* Boiss. Fl. or. III, p. 832). — Perennis. Caules 1—2, sulcati, arcuati, glabri vel 50—60 cm alti, in parte inferiore simplices, 4—5 mm in diam. parce pilis crispulis vel rigidis obtecti, in parte superiore dichotome-ramosi, sub capitulo plus minusve canescentes. Folia glabra rigida in parte inferiore pilis rigidis oblecta utrinque venulis valde exculptis, margine undulata, erosa, vel irregulariter dentata, dentibus interdum cartilagineis, folia radicalia oblongo-lanceolata 18 cm longa, 3 cm lata, basi in petiolum sensim attenuata, folia caulina semiamplexicaulia oblongo ovata vel ovata, apice obtusata vel acutiuscula. 6—14 cm longa, 4—6 cm lata. Capitula media, 8—12 cm in diam. Involucrum campanulatum, squamae exteriores minimae, canescentes, nigrae, squamae interiores anguste lanceolatae 13—16 cm longae, dorso pilis rufis glandulosis crispulis, apice nigrae, margine plus minusve late scariosae. Achaenia subprismatica, apice subattenuata, valde striata, crocea vel pallide straminea, 8—9 mm longa. Pappus niveus 11 mm longus. Ligulae luteae.

Asia Media: Tadjhikistania, Darvaz, in loco Chobu, 8. VII. 1897, (W. Lipsky).

От близкого *C. rigida* W. K. отличается слабым опушением, более высоким ростом, стеблевыми листьями менее жесткими и более крупными, шафранно-желтым цветом зрелых семян.

Crepis alaica H. Krasch. et M. Pop. sp. n. — *Joungia alaica* H. Krasch. in sched. (sect. *Joungia*). — *Joungia flexuosa* Ledb. var. *corniculata* C. Winkl., nom. nud. — *J. pygmaea* Ledb. var. *dentata* C. Winkl. non Ledb. (in Herb. Acad. Sci. USSR). — Glaberrima, glauca, caules 1—2, erecti, 5—10 cm alti a basi plus minusve ramosi, ramis flexuosis, divaricatis, teretibus, folia crassa reticulata in sicco interdum valde rugosa, integra margine irregulariter crenato-dentata, plus minusve revoluta, dentibus iterum denticulatis cartilagineis, folia radicalia obovata vel obovato-oblonga, basi breviter petiolata, 2—2.5 cm longa, 8—10 mm lata, folia caulina oblongolinearia, 1—2 cm longa, 1—10 mm lata, interdum basi semiamplexicaulia. Capitula breviter pedunculata, anguste cylindrica, basi attenuata, 10—12 mm longa, 3—4 mm in diam. Squamae flavidae vel nigrescentes, squamae exteriores lanceolatae subaequales, minimae, 3—4 mm longae, squamae interiores lineares, 10—12 mm longae, dorso planae vel carinatae, apice obscure corniculatae et barbellatae, margine plus minusve scariosae. Flosculi rosei (?) vel rubri (?). Achaenia 7—8 mm longa, apice attenuata, pappus 5—6 mm longus albus, setis scabridis.

Asia Media: Tadjhikistania: in jugo Alai, ad ripam lapidosam flum. Togus-kungei, 6. VII. 1895 (Korshinsky); Arcza-bulak, 5. VII. 1878 (Kuscha-kevicz); in valle flum. Alai, in ripa glareosa rivi Min-jar, confluvii sinistri