

la maturité, dans leur moitié inférieure, puis contractées en urcéole couronné par la moitié supérieure de ces mêmes folioles rapprochées en pinceau. Akènes extérieurs gibbeux extérieurement, pubescents sur la face opposée, à aigrette latérale et presque horizontale; ceux du disque subcylindriques, un peu arqués, striés, à aigrette terminale. Feuilles presque toutes radicales pétiolées, roncînées ou pennatifides; les caulinaires sessiles, embrassantes-subsagittées, entières ou incisées-dentées. Tiges naissant ordinairement plusieurs au collet de la racine, la centrale parfois unique et dressée, les latérales étalées-redressées, toutes fistuleuses et renflées surtout dans le voisinage des fleurs. Racine fusiforme, annuelle. — Calathides épanouies d'environ un centimètre de diamètre, à fleurs jaunes, une fois plus longues que le péricline; les extérieures brunâtres en dessous.

Hab. Toute la région méditerranéenne; la Corse (I) Mai-juin.

PTEROTHECA. (Cass dict. sc. nat. 25, p. 62.)

Péricline ovale, composé de folioles imbriquées; les extérieures formant un calicule. Akènes *biformes*, ceux du disque *linéaires*, subcylindriques et atténués en bec au sommet; ceux du bord gros, convexes-arrondis et subcarénés sur la face dorsale, *parcourus*, sur la face opposée, par 3-5 côtes ou ailes membraneuses; aigrette à poils capillaires. Réceptacle couvert de paillettes capillaires.

P. NEMAUSENSIS Cass. l. c.; Koch, *syn.* 500; Dub. *bot.* 299; *Crepis nemausensis* Gouan, *ill.* 60; *C. nuda* Lam. *fl. fr.* 2, p. 110; *Andryala nemausensis* Vill. *Dauph.* 3, p. 66, t. 26; *D C. fl. fr.* 4, p. 38; *A. nudicaulis* Lam. *dict.* 1, p. 154; *Lagoseris nemausensis* et *bifida* Koch, *syn. ed.* 1, p. 435; *Trichocrepis bifida* Vis. *dalm.* p. 18, t. 7; *Hieracium sanctum* L. sp. 1127?. *F. Schultz, exsicc.* 396. — Calathides en corymbe rapproché, à rameaux dressés, hérissés de poils glanduleux. Akènes extérieurs gros (triples et quadruples des autres), tricarénés sur la face interne; akènes du disque linéaires, striés, glabres, et entremêlés de quelques autres hérissés de poils glanduleux étalés horizontalement. Feuilles oblongues, obtuses, lyrées ou dentées, pubescentes, toutes radicales. Tiges naissant plusieurs sur le collet de la racine, de 1-3 décimètres, poilues-hérissées, simples et rameuses seulement au sommet. Racine fusiforme, annuelle.

Hab. Tout le midi de la France; Toulouse; Lectoure dans le Gers; la Corse. (I) Mai-juin.

CREPIS. (L. gen. 914, part.)

Péricline composé de folioles dont les extérieures forment ordinairement un calicule, et plus rarement régulièrement imbriquées. Akènes *tous uniformes*, arrondis ou subcomprimés, portant 10-30 stries longitudinales, *amincis au sommet ou terminés en bec*. Aigrette à poils capillaires. Réceptacle nu, glabre ou fibrilleux-poilu. — Fleurs jaunes, dans nos espèces, excepté dans le *C. aurea*.

longues et raides non glanduleuses, pourvues intérieurement de poils appliqués; les extérieures une fois plus courtes, très-étalées. Corolles jaunes, concolores. Stigmates livides. Akènes d'un jaune-brunâtre, fusiformes, à 10 côtes hérissées de pointes; bec grêle, *épaissi* au sommet, et *un peu plus court* que l'akène; aigrettes dépassant à peine le péricline; réceptacle glabre. Feuilles roncînées-dentées, ou lyrées-roncînées; les radicales pétiolées, dressées-étalées; les caulinaires supérieures entières ou dentées-incisées à leur base, embrassant la tige par deux oreilles. Tige dressée, striée, fistuleuse, feuillée, très-rameuse; rameaux dressés. — Plante d'un vert gai, souvent purpurine à la base, inodore, plus ou moins hérissée de soies raides étalées. Racine fusiforme, annuelle.

Hab. Lorraine; Alsace; Champagne; environs de Paris; la Marne; l'Yonne; le Cher; Rhône; Saône-et-Loire; Loire; Haute-Loire, etc.; Corse, Ajaccio, etc.
 (1) Juillet-août.

b. *Stigmates jaunes; pédoncules penchés avant l'anthèse.*

C. CÆSPITOSA Gren. et Godr.; *Barkhausia cæspitosa* Moris, *fl. sard.* 2, p. 324, t. 92. — Folioles du péricline linéaires-obtus, scariées aux bords, pubescentes extérieurement, presque glabres intérieurement; les extérieures courtes et très-étroites. Corolles jaunes, les extérieures purpurines en dessous. Stigmates jaunes. Akènes jaunâtres, à 10 stries chagrinées; bec filiforme, *égalant* seulement les deux tiers de l'akène; aigrettes un peu plus longues que le péricline; réceptacle velu. Feuilles glabres ou hérissées sur la nervure dorsale, oblongues, sinuées-roncînées; les caulinaires 1-3, linéaires, dentées ou entières. Tiges de 2 décimètres au plus, naissant ordinairement plusieurs sur la souche, non sillonnées, grêles, *dressées*, glabres ou hérissées inférieurement de poils étalés, toujours glabres dans leur partie supérieure, simples et monocéphales, ou divisées en 2-3 rameaux très-longs, dressés, et terminés par une seule fleur. Souche *vivace*.

Hab. Corse, glacière de Bastia! et Saint-Annonza! (Bernard). 27 Juin.

C. DECUMBENS Gren. et Godr.; *Barkhausia decumbens* Nob. *mss.* — Péricline à folioles linéaires-obtus, à peine scariées aux bords, munies extérieurement et surtout à la base d'un duvet blanchâtre et pulvérulent, et intérieurement de quelques poils appliqués; les extérieures plus courtes, lâches. Corolles jaunes, celles de la circonférence subpurpurines en dessous. Stigmates jaunes. Akènes gris-fauves, fusiformes, *petits* (3 mill. de long), à 10 côtes chagrinées, à bec filiforme, *égal* à l'akène; aigrettes dépassant le péricline de la moitié de leur longueur. Feuilles roncînées-pennatifides; les radicales pétiolées-étalées; les caulinaires d'abord roncînées, puis dentées et linéaires vers le sommet des tiges. Celles-ci naissant plusieurs sur le collet de la racine, *couchées-redressées*, et disposées en cercle, faiblement striées, grêles, rameuses et pauciflores. — Cette plante se rapproche de la *C. recognita*; mais ses tiges grêles

et couchées, ses stigmâtes jaunes, ses pédoncules penchés avant l'anthèse, ne permettent aucune confusion.

Hab. Corté (Bern. rd). (2) Juin?

C. LEONTODONTOIDES *All. ped. auct.* 15; *Lois. gall.* 2, p. 195; *Barkhausia Leontodon* *D C. fl. fr.* 4, p. 43; *Dub. bot.* 299; *B. leontodontoides* *D C. prod.* 7, p. 156; *Castagne, cat. Marseille*, p. 89; *B. tenerrima* *Ten. ind. sem.* 1830, p. 14; *Pre-nanthes Negrelii* *Req. in cat. Toulon*, p. 115. — Folioles du péri-cline linéaires, subaiguës, à peine scarieuses aux bords, pulvéru-lentes à l'extérieur, et très-faiblement à l'intérieur; les extérieures étroites et courtes. Toutes les corolles jaunes sur les deux faces. Stigmâtes jaunes. Akènes bruns, fusiformes, à 10 stries rugueuses; bec filiforme, presque égal à l'akène; aigrettes dépassant très-peu le péri-cline; réceptacle velu. Feuilles *minces*, papiracées, glabres ou pubescentes sur la nervure dorsale, étroitement oblongues, ronci-nées-pennatifides, à 8-10 paires de dents triangulaires recourbées; les caulinaires 1-2, linéaires. Tige de 2-5 décimètres, glabre ou pubescente inférieurement, *très-grêle*, substriée, divisée en quel-ques rameaux ascendants, *très-longs et pauciflores*. Racine grêle, fibreuse. — Cette plante, par ses tiges dressées, grêles, allongées, pauciflores, à pédoncules très-longs, est très-distincte de toutes ses congénères.

Hab. Iles d'Hyères (Perreymond! Robert!); Marseille (Castagne); Corse, Ajaccio (Clément); Sariène (Bernard). (2) Mai-juin.

C. SUFFRENIANA *Lloyd, fl. Loir. inf.* 155; *C. bellidifolia* β . *Lois. gall.* 2, p. 195; *Barkhausia suffreniana* *D C. cat. Monsp.* 83; *D C. fl. fr.* 5, p. 450; *Dub. bot.* 298; *Crepis cernua* *Tenor. prod. nap.* 47? — Folioles du péri-cline linéaires, subaiguës, à peine scarieuses aux bords, pubérulentes à l'extérieur et portant une rangée de soies rudes sur la côte dorsale, presque glabres intérieurement; les extérieures courtes, très-étroites. Corolles jaunes ainsi que les stigmâtes. Akènes bruns-foncés, à 10 côtes saillantes, ondulées et non finement tuberculeuses; bec filiforme, *égalant le tiers* de l'akène; aigrettes *dépassant très-peu (ou pas)* le péri-cline; récep-tacle faiblement velu. Feuilles pubescentes; les radicales spatulées-oblongues, entières, sinuées ou pennatifides; celles de la tige en-tières. Tiges 1-5, de 5-10 centimètres, *dressées*, très-hérissées jus-qu'au tiers de leur longueur de poils raides qui disparaissent vers le sommet. Racine pivotante, grêle, annuelle. — Plante d'un vert sombre et un peu grisâtre.

Hab. Sables maritimes des environs de Nantes (Lloyd); Arles (Suffren). (1) Mai-juin.

Obs. — Koch, dans son *Synopsis*, a placé la *C. neglecta* *L., cernua* *Ten.* à la suite de la *C. virens* *Vill.* Mais, par son akène, la *C. neglecta* doit se ranger à la suite de la *C. suffreniana*, avec laquelle elle a de grands rapports, et dont elle diffère: par sa teinte d'un vert clair; ses feuilles presque glabres, et dont les