

132. *C. nicaeensis* Balb. in Pers. syn. pl. II. p. 376. *C. agrestis* Led. fl. ross. II. p. 822, nec W. et K. In der Krim von Rögner gesammelt.

133. *C. angustifolia* d'Urv. enum. pl. Archip. 101. Obwohl mein Exemplar, was ich von Rögner aus der Krim erhalten habe, sich durch den Mangel der pfeilförmigen Abschnitte an der Basis der Blätter unterscheidet, so möchte es doch hierher gehören.

### B. *Multicostata*.

134. *C. dens leonis* C. Koch; Annua; Caulis erectus, basi ramoso-divaricatus, ramis elongatis simplicibus aut subramosis, foliis fulcratis, sed aphyllis, inferne puberulus, ceterum glabriusculus; Folia radicalia et caulina infera puberula, oblonga, pinnatifido-runcinata, pinnis lineari-oblongis, acutis, denticulatis, supremis confluentibus, rhachi denticulata; Folia ramos fulcrantia lanceolata, basi auriculata, sed auriculis sursum versus patentibus; Pedunculi elongati, superne saepe curvati, glaberrimi; Anthodii phylla accessoria linearia, patula, cetera canescentia, sed nervo medio obscuro-viridi instructa; Achenia 20-striata, nigricanti-brunnea, basi et apice paululum attenuata. Aehnelt der *C. agrestis* W. et K., hat aber noch einmal so grosse Blüthenkörbchen; es fehlt ihr auch die drüsige Pubescenz. Sonst gleicht sie der *B. rhoadifolia* (*Crepis*) L., die aber Achenienschnäbel besitzt. Vielleicht gehört auch *C. interrupta* DC. nec Sibth. hierher, wenigstens ist sie sehr ähnlich. Im Gane Chewi mitten im Kaukasus auf Trachyt und Thonschiefer, c. 5600' hoch.

*C. Brachyderea* Cass. dict. d. sc. nat. XLVIII. p. 429.

135. *C. pannonica* (*Hieracium*) Jacq. Coll. V. p. 148. *C. rigida* W. et K. pl. rar. Hung. I. p. 18. t. 19. In der