

nuatis cæterū glabris lucidis lätè virentibus irregulariter et remotè dentatis dentibus brevibus triangularibus acutis, caule tenui erecto folia multò superanti superñe dichotomè 2-4 cephalo pedunculis longis rectis parcè linear-squamulosis, foliis caulinis 1-2 longè et angustè linearibus integris, capitulis mediocribus, involucrī brevissimè farinoso-tomentelli squamis accessoriis paucis triplò brevioribus linear-lanceolatis phyllis nigricantibus linearibus obtusiusculis angustè albo-marginatis, ligulis pallidè flavis concoloribus involucro sesquilongioribus, acheniis subangulatis multistriatis utrinquè vix perspicuè attenuatis pappo niveo pauciseto eis paulò longiori terminatis exterioribus subincurvis.

Hab. in rupibus montis Athonis. (Aucher N° 3277, Friw.)

Folia cum petiolo ferè triplicaria 4-6 lin. lata, caules 10-12 pollic., capitula magnit. *Leont. hastilis*. Species distinctissima ex affinitate *Cr. crocifoliae* Boiss. et Heldr. quæ differt foliis angustissimis integris, acheniis lèvibus apice valdè attenuatis, etc.

CREPIS RAULINI Boiss. (Sect. *Eucrepis*.)

Cr. perennis tota setis sparsissimis glanduliferis parcè obsita, rhizomate incrassato duro cæspitoso, foliis omnibus radicalibus viridibus oblongis in petiolum attenuatis parcè et remotè repando-denticulatis, scapis monocephalis folia paulò superantibus squamis paucis setaceis obsitis, capitulis mediocribus, squamis accessoriis paucis linear-setaceis adpressis involucro dimidiò brevioribus, involucrī phyllis angustè linearibus acutis præter pubem sparsam brevissimam farinaceam setulis glandulosis paucis obsitis, ligulis flavis concoloribus involucro vix sesquilongioribus, acheniis..., pappo niveo.

Hab. in Cretā undè retulit et mihi comm. cl. Dr. Raulin.

Planta mihi ex unico specimine nota specimina parva *Seriolæ levigatæ* quodammodo referens, folia pollicem aut paulò amplius longa 4-5 lin. lata acutiuscula acutè breviter et parcè dentata, scapi radicales bipollicares, capitula magn. *Cr. divaricatae* cui accedit sed a qua distinctissima.

CREPIS ELBRUSENSIS Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Hieracioides*.)

Cr. rhizomate filiformi nudo, foliis rosulatis confertis pilis albis

brevibus densè hirtis abbreviatis petiolatis lyrato-pinnatipartitis segmentis subretrorsis oblongis triangularibusve parvis iterum sæpè argutè pinnatilobatis integrisve-terminali majori oblongo argutè et remotè denticulato obtusiusculo breviter mucronato, caulis glabris folia 2-3 plò superantibus semel vel bis divaricatum bifurcis præter squamulam linearem ad dichotomiam sitam nudis, capitulis mediocribus pedunculo longo supernè nigro-glanduloso suffultis, calyculi squamis ovato-oblongis acutiusculis involucro triplò brevioribus, phyllis livescentibus præter pubem brevissimam farinaceam secùs lineam medium glanduloso-setulosis, ligulis flavis concoloribus involucro sesquilongoribus, acheniis rectis cylindricis 12-15 striatis obsoletè attenuatis pappo niveo caduco eis breviori superatis.

Hab. in loco *Char Gerdene* dicto propè pagum *Asadbar* in parte occidentali montis *Elbrus* Kotsch. № 471, Aucher № 4855. Huc quoque spectare videtur Kotschy № 676 e monte *Totschal* (forma major).

Folia rosulata pollicem vel sesquipollinem longa, caules 3-4 pollicares, capitula magn. *Cr. Bithynicæ*, involuci phylla 4 lin. longa. Ex affinitate *Cr. heterotrichæ* et *Bithynicæ*.

CREPIS ROBERTOIDES Boiss. (Sect. *Hieracioides*.)

Cr. rhizomate cæspitoso petiolis vetustis valdè squamoso, foliis sublente parcissimè puberulis vel omnino glabris omnibus radicalibus cæspitosis linearibus interruptè pinnatipartitis rachide angustè linearis planâ segmentis triangularibus vel linearis-oblongis acutis sæpè subretrorsis valdè inæqualibus terminali oblongo acuto, caulis numerosis scapiformibus monocephalis folia duplo superantibus squamulâ una alterave setacea obsitis, capitulis minutis, squamis accessoriis paucis angustè linearis-lanceolatis adpressis involucro triplò brevioribus, involuci phyllis parcè et brevissimè farinoso-puberulis livescentibus linearibus acutis, ligulis flavis subtus rubellis involucro sesquilongoribus, acheniis subangulatis multistriatis rectis utrinque vix manifestè attenuatis pappo sordido eis æquilongo superatis.

Hab. in regione superiori *Hermonis* suprà *Rascheya* ubi gregariè crescit alt. 8000-9000'. Legi flor. Julio 1846.

Folia cæspitosa flacidula 1 1/2-2 poll. longa laciniis tenuibus 1 1/2-2 lin. longis, scapi 2-2 1/2 pollicares, capitula magnit. eorum *Robertiae taraxacoidis* cuius habitum omnino refert. Species pulchella.