

*Hieracium erucaefolium hirsutum*, Bauh. hist. 2. 1025. c. ic. Moris. hist. 3. 2. 7. t. 5. f. 14.

*β. dentata*: foliis integris dentatis.

Habitat in pratis Bohemiae. ◎

Tota pilis brevibus deosis hirta, superne viscosa sordescens sere uti *Borkhausia foetida*. Folia variant uti in *C. tectorum* aut runcinata, aut integra dentata. *C. bienni* toto habitu proxima, sed differt radice annua, tenuitate omnium partium dense hirtarum, floribus duplo minoribus dense glandulosis viscosis.

3. *Crepis erucaefolia*: caule erecto ramoso, foliis inferioribus sub 2-pinnatifidis, superioribus pinnatifidis sessilibus, laciis rachique lanceolato-dentatis, floribus racemosis incanis, involucro laxo linearis.

*Hieracium maximum erucae folio*. Tourn. inst. 469.

Habitat in Italia. (Sieb.)

Planta magna caule ramoso, apice canescente. Folia pilis minimis aspera, margine scabra, carina nuda, oblonga, superiora sessilia, auriculis s. foliorum laciis inferioribus a basi remotioribus. Flores magnitudine *C. biennis* in racemos congesti, pedunculis incanis.

4. *Leontodon scariosus*: involueri squamis ovatis erectis scariosis (fuscis), scapo brevissimo declinato, foliis profunde runcinato-pinnatifidis, laciis rachique linearibus argute dentatis.

Habitat in Sibiria ad lacus salso. Gmelin. 24