

la maturité, dans leur moitié inférieure, puis contractées en urcéole couronné par la moitié supérieure de ces mêmes folioles rapprochées en pinceau. Akènes extérieurs gibbeux extérieurement, pubescents sur la face opposée, à aigrette latérale et presque horizontale; ceux du disque subcylindriques, un peu arqués, striés, à aigrette terminale. Feuilles presque toutes radicales pétiolées, roncînées ou pennatifides; les caulinaires sessiles, embrassantes-subsagittées, entières ou incisées-dentées. Tiges naissant ordinairement plusieurs au collet de la racine, la centrale parfois unique et dressée, les latérales étalées-redressées, toutes fistuleuses et renflées surtout dans le voisinage des fleurs. Racine fusiforme, annuelle. — Calathides épanouies d'environ un centimètre de diamètre, à fleurs jaunes, une fois plus longues que le péricline; les extérieures brunâtres en dessous.

Hab. Toute la région méditerranéenne; la Corse. ① Mai-juin.

PTEROTHECA. (Cass dict. sc. nat. 25, p. 62.)

Péricline ovale, composé de folioles imbriquées; les extérieures formant un calicule. Akènes *biformes*, ceux du disque *linéaires*, subcylindriques et atténués en bec au sommet; ceux du bord gros, convexes-arrondis et subcarénés sur la face dorsale, *parcourus, sur la face opposée, par 3-5 côtes ou ailes membraneuses*; aigrette à poils capillaires. Réceptacle couvert de paillettes capillaires.

P. NEMAUSENSIS Cass. l. c.; Koch, *syn.* 500; Dub. bot. 299; *Crepis nemausensis* Gouan, *ill.* 60; *C. nuda* Lam. fl. fr. 2, p. 110; *Andryala nemausensis* Vill. Dauph. 3, p. 66, t. 26; DC. fl. fr. 4, p. 38; *A. nudicaulis* Lam. dict. 1, p. 154; *Lagoseris nemausensis* et *bifida* Koch, *syn. ed.* 1, p. 453; *Trichocrepis bifida* Vis. dalm. p. 18, t. 7; *Hieracium sanctum* L. sp. 1127?. F. Schultz, *exsicc.* 396. — Calathides en corymbe rapproché, à rameaux dressés, hérissés de poils glanduleux. Akènes extérieurs gros (triples et quadruples des autres), tricarénés sur la face interne; akènes du disque linéaires, striés, glabres, et entremêlés de quelques autres hérissés de poils glanduleux étalés horizontalement. Feuilles oblongues, obtuses, lyrées ou dentées, pubescentes, toutes radicales. Tiges naissant plusieurs sur le collet de la racine, de 1-3 décimètres, poilues-hérissées; simples et rameuses seulement au sommet. Racine fusiforme, annuelle.

Hab. Tout le midi de la France; Toulouse; Lectoure dans le Gers; la Corse. ① Mai-juin.

CREPIS. (L. gen. 914, part.)

Péricline composé de folioles dont les extérieures forment ordinairement un calicule, et plus rarement régulièrement imbriquées. Akènes *tous uniformes*, arrondis ou subcomprimés, portant 10-30 stries longitudinales, *amincis au sommet ou terminés en bec*. Aigrette à poils capillaires. Réceptacle nu, glabre ou fibrilleux-poilu. — Fleurs jaunes, dans nos espèces, excepté dans le *C. aurea*.

β. *intybacea*. Feuilles caulinaires supérieures à oreillettes larges, arrondies et dentées; péricline glabre. *Barkhausia intybacea* D C. *cat. monsp.* 82, et *fl. fr.* 5, p. 449.

Hab. Les prés et les collines de toute la France. (2) Mai-juin.

C. RECOGNITA Hall. *fl. Crep. im. nat. anz.* 1818, n° 5; *Gaud. helv.* 5, p. 154; *Barkhausia recognita* D C. *prodr.* 7, p. 154; *Castagne, cat. Marseille*, p. 88; *C. Leontodon* Mut. *fl. fr.* 2, p. 216 (*quoad. pl. Vesuntionis*). — Cette plante est très-voisine de la précédente. Elle en diffère par ses tiges couchées ou inclinées et naissant en grand nombre du collet de la racine, minces, bien moins longues (2-3 décimètres), peu rameuses, dépourvues de feuilles et portant seulement quelques écailles foliacées; par ses calathides un peu plus étroites et plus nettement cylindriques à la maturité; par son péricline grisâtre et non noirâtre, si ce n'est au sommet (ce qui, à la maturité, donne à la plante un facies bicolor); par son inflorescence assez semblable à celle de la *Crepis diffusa* D C.; par l'époque de la floraison, qui est presque de deux mois plus tardive. — La plante du midi et celle du nord-est (Besançon, Mutzig) ne nous ont présenté aucune différence.

Hab. Très-commun sur toutes les collines et lieux secs, bords des chemins du Midi; Saint-Germain-en-Laye (Parseval); Besançon (Grenier); Mutzig (herb. Godron). (2) Juin-juillet.

C. ERUCÆFOLIA Gren. et Godr.; *Barkhausia erucæfolia* Nob. *mss.* — Folioles du péricline linéaires-obtuses, scarieuses aux bords, pubérulentes extérieurement, munies intérieurement de quelques poils appliqués; les extérieures très-fines, 2 fois plus courtes. Corolles jaunes, celles du bord brunes en dessous. Stigmates noirâtres. Akènes fauves, fusiformes, à 10 côtes finement tuberculeuses; bec filiforme, trois fois aussi long que l'akène; aigrette dépassant un peu le péricline; réceptacle velu. Feuilles étalées en rosette, nombreuses, pétiolées, glabres ou pubérulentes surtout sur la nervure médiane, pennatipartites, à 5-7 paires de segments ovales ou oblongs, un peu recourbés, bordés de dents blanches-cartilagineuses, le terminal ovale, très-grand; les feuilles caulinaires infér. roncînées; toutes les autres linéaires. Tiges de 2 décimètres, rameuses, étroitement corymbiformes au sommet, à rameaux dressés-contigus, pubescents-subtomenteux. — Plante d'un vert-blanchâtre et un peu glauque; son akène la place à côté de la *C. senecioides* Delill.

Hab. Probablement naturalisée dans le lazaret de Marseille (Guérin). (2) Juin?

C. SETOSA Hall. *fl. in Ræm. arch.* (1796) 1, pars 2, p. 1; *Koch, syn.* 502; *C. hispida* W. *K. hung.* 1, t. 43; *Lois. gall.* 2, p. 196; *Barkhausia setosa* D C. *fl. fr.* 4, p. 44, et *ic. rar.* t. 19; *Dub. bot.* 298. *Schultz, exsicc.* 254. — Folioles du péricline linéaires-aiguës, fortement carénées et munies sur le dos de soies