

si difiere, ó no, de la planta madrileña: de las muestras sicilianas sí que difieren las de Sevilla.

De la *O. geminiflora* Lag. difiere por sus dientes foliares agudos (Cf. Nyman. consp., pág. 161), y de la *O. biflora* por sus estípulas.

No conozco la *O. Hackelli* Lge.

Stachys hirta L.—*Lithospermum Apulum* Vahl.—*Stipa tortilis* Desf.—*Anthyllis tetraphylla* L.—*Molineria minuta* Parl. β *bætica* Willk.

La planta única que traje, recogida entre los trigos, difiere del tipo por sus hojas de 25 á 35 mm. de longitud y estatura (32 cm.).

Valerianella coronata DC.—*Koeleria phleoides* P.—*Trisetum scabriusculum* Coss.—*Silene Iusitanica* L.—*S. colorata* Poir.— β *lasiocalyx* Soy. Will.—*Scorpiurus sulcata* L.—*Anchusa Italica* Retz.—*Poterium dioicum* Pau.

Cabezuelas del *P. Mauritanicum* Boiss., hábito del *P. muricatum* Spach.

Difiere de todos sus afines por los festones de todas sus hojuelas menos profundamente cortados, y sobre todo por las flores masculinas y femeninas llevadas en pies diferentes.

Las muestras traídas presentan los frutos poco desarrollados para describirlos.

Puerto de Santa María y Puerto Real.

(18 y 19 de Abril.)

Kruberia leptophylla Hfn.—*Oenanthe globulosa* L.—*Orlaya maritima* Koch.—*Daucus muricatus* L.—*Thapsia decusata* Lag.—*Crepis Erythia* Pau. (*C. vesicaria* var. *Willkommii* Pérez Lara?—*C. scariosa* Willk. prodr. II, pág. 247.)

No conozco la variedad propuesta por el Sr. Pérez Lara y, por lo mismo, ignoro si puede referirse ó no á mis muestras del Puerto de Santa María que recogí en los arenales marítimos. Dudo de la identidad, porque mis plantas no tienen nada que ver (específicamente) con la *C. vesicaria* L., pues difiere por sus hojas, escamas interiores y exteriores de la cabezuela.

Mis plantas (formas humildes probablemente) presentan unos 15 cm. de altura, las hojas radicales son en algunos pies más largas que la inflorescencia, que es un corimbo de pocas

flores, las brácteas son lineo-lanceoladas, enteras, las escamas exteriores pégadas á las internas ó poco separadas, las internas alampañadas en el ápice lanceolado-puntiagudo.

Especie intermedia entre la *C. vesicaria* L. y *C. taraxacifolia* Thuill.; pero más afine de esta última, y sobre todo de su variedad *Cr. recognita* Hall. f.

Picridium intermedium Schultz α) *robustum* Willk.—*Cotula coronopifolia* L. (dos formas: *pumila* y *elata*.)—*Actheorrhiza bulbosa* Cass.—*Erodium laciniatum* Willd.—*Erodium Salzmanni* Del.

Este geranio, de flores blancas y pequeñas, presenta la membrana blanca que rodea los dos hoyuelos del carpelo y que no llevan las especies afines (*E. cicutarium* Hérit., *E. Jacquinianum* Fisch. & Mey. y *E. sabulicula* Lge.).

Perideræa fuscata Webb.—*Veronica racemigera* P. Lara.—*Geropogon glaber* L.—*Statice sinuata* L.—*Limoniostrum articulatum* M.—*Ruta Chalepensis* L.—*Ophris lutea* Cav.—*Retama monosperma* Boiss.—*Phlomis purpurea* L.—*Cerinthe major* L. cum var. β *purpurascens* Boiss.—*Melandrium macrocarpum* Wk.—*Anagallis linifolia* L.—*Lithospermum apulum* Vahl.—*Juniperus turbinata* Guss.—*Malcolmia littorea* R. Br. β *alyssoides* Boiss.—*Convolvulus italicus* R. S.

Esta planta, nueva para la flora de España, parece que pasó desapercibida para los botánicos que recorrieron este país. Se encuentra en las ribazadas del camino de hierro entre el puente y Puerto Real.

Mis muestras llegaron en tan mal estado, que hube de tirarlas casi todas, sin dejar más que dos fragmentos, los menos deteriorados y cubiertos de moho, que produjo la humedad de los papeles en la prensa, que son los que guardo.

Helianthemum eriocarlon Dun.—*H. salicifolium* P. var. *trifoliatum* Wk.—*H. ledifolium* W. var. *macrocarpum* Wk.—*H. lasiocarpum* Desf. var. *leiocarpum* Pau. (vel. *H. ledifolium* W. var. *angustifolium* Pau.)

El hábito y estructura son más bien del *H. lasiocarpum* Desf. que del *H. ledifolium* W.; del primero difiere por sus cúpulas lampiñas; del segundo, por sus hojas lineales; de ambos, por sus flores blancas. Si admitimos la primera teoría, resulta que pertenece á subespecie nueva para la flora de España.

Se encuentra en los prados de Puerto Real y no escaso. Mis ejemplares son todos jóvenes.