

parce ramosis, foliis fere omnibus radicalibus obovatis vel oblongis dentatis vel inferne pinnatifidis, ramulis et pedunculis capillaribus ante anthesin nutantibus, capitulis minutis, involucri phyllis externis breviter et tenuiter subulatis internis glabris vel dorso parce setulosis, acheniis oblongis striatis in rostrum tenue achenio ipso dimidio brevius attenuatis, receptaculo glabro ♂.

Hab. in collibus regionis inferioris et montanæ Cretæ ad Akrotiri et Aradrena (Raul! Noë exs. sub *B. bellidifoliâ*!).

Caules 2-4-pollicares, capitula magn. *C. neglectæ* vel minora; huic affinis sed distincta acheniis in rostrum duplo tenuius longiusque abeuntibus. *C. Suf-freniana* differt caulis crassioribus rigidis inferne valde scabris, pedunculis non capillaribus, acheniis duplo longioribus; *C. bellidifolia* et *leontodontoides* radice bienni.

47. *C. pterothecoides*, crebre et breviter papilloso-glandulosa, caulis humilibus tenuibus a parte inferiori dichotomis, foliis radicalibus rosulatis parvis obovato-oblongis breviter petiolatis dentatis vel runcinatis, caulinis præter inferius amplexicaule anguste lanceolatum dentatum ad dichotomias linear-setaceis, pedunculis elongatis breviter piloso-glandulosis, capitulis mediocribus fructiferis cylindricis, involucri breviter glanduloso-hirti phyllis externis triplo brevioribus adpressis triangulari-lanceolatis interioribus facie internâ glabris, acheniis elongatis tenuiter et obsolete striatis externis brevius internis a parte dimidiâ sensim attenuato-rostratis, pappo niveo achenium non superante ♂.

Hab. in glareosis saxosis montosis Garbi Antilibani supra Zehdani 5000' (Ky. 33!).

Facies omnino *Pterothecæ Nemavensis* vel *bifidæ*, sed receptaculum non piliferum. Scapi 4-6-pollicares, folia radicalia 1-1 $\frac{1}{2}$ -pollicaria, involucrum fructiferum sex lineas longum, achcnia 3-3 $\frac{1}{2}$ longa.

48. *C. fallax*, parce et patule pilosula, caule erecto foliato stricte ramosissimo ramis laxe cymosis, foliis teneris viridibus lyrato-pinnatipartitis segmento terminati ovato-cordato obtusiusculo lateralibus basi confluentibus triangularibus retrorsis acutis, radicalibus in petiolum attenuatis caulinis subsessilibus et sessilibus basi sagittatis, bracteis herbaceis linearisubulatis, capitulis mediocribus, pedunculis virgineis cernuis, involucri fructiferi sub apice valde constricti phyllis externis linearisubulatis tandem patentibus glabris, internis quadruplo longioribus dorso demum carinato setis mollibus glandulosis et eglandulosis hispidis, acheniis marginalibus phyllis inclusis scabridis sensim attenuatis erostris, cæteris in rostrum tenue triplo longius attenuatis, pappo niveo involucrum multo superante ②.

Hab. in Anatoliæ australis maritimæ montosis prope Anamour (Péronin!).

Planta 1 $\frac{1}{2}$ -3-pedalis inter *C. setosam* et *fætidam* facie intermedia, a priori pedunculis cernuis, capitulis majoribus, involucri setis tenuibus nec aculeiformibus, acheniis difformibus longius rostratis distincta, posteriori magis affinis sed distincta foliis teneris glabrescentibus, capitulis minoribus, involucro

fructifero apice valde constricto, phyllis externis glabris patentibus nec adpressis ciliato-asperis, acheniis brevioribus. Receptaculum omnino epaleaceum quo et fere unico charactere a *Rodigia commutata* simillimâ distinguitur.

49. **C. fœtida** (L. Sp. 1133) caule erecto foliato a parte inferiori vel superne ramoso ramis erecto-patulis laxe 1-4-cephalis, foliis plus minusve hirsutis interdum glandulosis sœpe crebre setuloso-asperis inferioribus in petiolum attenuatis runcinato-pinnatifidis partitisve interdum sublyratis rarius sinuato vel repando-dentatis, caulinis basi incisâ biauriculatis oblongis vel lanceolatis, pedunculis elongatis ante anthesin cernuis, capitulis majusculis. involucro cano-tomentoso vel plus minus longe et crebre setoso pilis brevioribus glandulosis sœpe intermixtis, phyllis exterioribus adpressis lanceolatis internis triplo longioribus dorso demum obtuse carinatis induratis, acheniis externis teretibus vix striatis sensim subattenuatis erostribus, internis striatis scabridulis in rostrum tenue eis longius involucrum superans vel æquilongum abeuntibus ⊙ Ic. Engl. Bot. tab. 406. Rchb. t. 83. — *Barckhausia fœtida* D.C. Fl. Fr. — *B. glandulosa* Presl Sic. p. 31. — *B. graveolens* Link Enum. p. 290. ? — *B. Byzantina* D.C. Prodr. VII, p. 158. — *Barck. hirta* C. Koch Linn. XXIII, p. 687 !

Hab. in ruderatis, cultis et collinis totius ditionis, Græcia in Laconiâ ad radices Taygeti (Sart!), Atticâ (Heldr!), Thessaliâ ad radices Olympi (Orph!), Macedonia et Thraciâ (Griseb!), Byzantii (Sibth., Auch! Noë!), Anatoliâ in Lydiâ et Cariâ (Boiss!), Lyciâ (Bourg!), Lycaoniâ (Heldr!), Syriâ boreali et Mesopotamiâ ad Orfa (Haussk!).

β. rheadifolia. — Folia magis dissecta, rostrum acheniorum interiorum involucrum æquans aut subbrevis. — *B. rhæadifolia* M.B. Taur. Cat. II. p 259. — *Crepis rodigioides* Sch. Bip. in Ky. pl. Alepp. exs. et Phyt. Canar III, 457. — *Barck. Zacinthia* Marg. et Reut. Fl. Zac. p. 62. — *Crepis interrupta* Sibth. Fl. Gr. IX, p. 2, tab. 803 (forma humilior a collo ramosa).

Hab. in Cretâ (Sibth.), Zacintho (Marg!), Græciâ in Atticâ (Boiss!), Macedonia et Thraciâ (Griseb!), Anatoliâ meridionali et centrali (Bal!), Syriâ ad Aleppo (Ky. exs. 178!), Libano usque ad Eden (Bl!), Tauriâ, Caucaso et Transcaucasiâ (Ledeb., Rupr!), Persiâ boreali (Buhse!).

γ. maritima. — Radix perennans verticalis elongata collo pluricipiti, caulis humilibus ascendentibus parce ramosis vel monocephalis. Folia ut in typo pinnatipartita lyrata vel dentata. — *Crepis radiata* Fl. Græca VIII, p. 74, tab. 800. — *Barck. triangularis* C. Koch Linn. XXIII, p. 686.

Hab. in arenosis maritimis Thessaliæ ad Caterine (Orph!), Ponti Euxini ad Phanar (Sibth.), Ponti Lazici ad Rhizé (Bal!), Guriæ inter Poti et Hagios Nicolaos (Rupr!).

Planta polymorpha ex quâ botanici species plures valde instabiles condiderunt; varietates hic enumeratae sunt potius formæ altera in alteram transeuntes. Cl. Schultz Bipontinus *C. rodigioidi* suæ pedunculos virgineos rectos tribuit et hâc notâ eam a *C. fœtidâ* sejungit sed in eâ quoque capitula juniora nutantia video.