

- β. lanceolata* (Frœl. mss.), caule 1-cephalo, foliis caulinis lanceolatis sessilibus. (v. v. in Alp. Algov.)
- γ. biflora* (Frœl. mss.), caule 2-cephalo. (v. v. sp. in iisdem Alpibus.)
55. *C. FOETENS* (Frœl. in litt. 1837. non Linn.), caule erecto ramoso oligocephalo, foliis oblongis lyrato-runcinatis glabris, radical. petiolatis, caulinis hastato-auriculatis, pedunculis involucrique cano-tomentosis. \mathcal{U} in Armeniâ. *Hieracium foetidum* Willd. sp. 3. p. 1575. herb. n. 14646! Habitu formæ pygmææ Crep. biennis L. affinis. Gaudis subbipollicaris et ultrâ, ramis patulis sub-1-cephalis. Capitulum ovatum imbricatum. Flos luteus. (v. s. sp.)
56. *C. FOENICULACEA* (Frœl. in litt. 1837), caule erecto subfolioso paniculato sulcato glanduloso-hispido, foliis pinnatisectis, segmentis linearibus mucronatis integris partisque inæqualibus basi decurrentibus, pedunculis involucrique albo-tomentosis. \mathcal{U} ? in fissuris rupium et pratis saxosis Foro-Julii ad Dninum (Brign.), ad montem Zhaun (Graf.¹), in Carniolâ circa Quell et Prosecum, Tergesti in M. Spaccato. *Andryala chondrilloides* Scop. carn. 2. p. 115. t. 52. haud bon. *Berinia andryaloides* Brign. forojul. p. 50. *Crepis chondrilloides* Jacq. vind. p. 312. *Crepis Adonis* Spreng. pug. 1. p. 93. syst. 3. p. 687. *Barkhausia chondrill.* Bluff et Fingerh. fl. 2. p. 304. Flos Crep. rigidæ magnitudine et formâ similis. Capitulum ovatum imbricatum. Receptaculum foveolatum, foveolarum margine in juvenili plantâ in denticulos setaceos aliquot fisso hispidum, dein glabrum. (v. s. s.)
- † *Species non satis notæ.*
57. *C. ÆTHENSIS* (Presl fl. sic. 1. p. xxxi), caule adscendente subaphyllo oligocephalo, foliis runcinato-pinnatifidis glaberrimis, lobis horizontalibus ovatis, invol. villosis, calyculo adpresso. — in Siciliâ. Cæt. ign.
58. *C. AURICULÆFOLIA* (Sieb. in Spreng. syst. 3. p. 634), scapo bifido oligocephalo ad basin et ad ramificationes lanato, foliis radicalibus spathulatis glaberrimis glaucescentibus sursum dentatis, involucre albo-tomentoso. — in Cretâ. †
59. *C. CORIACEA* (Horn. h. hafn. 2. p. 768), foliis lanceolatis dentatis rigidis glabris, superioribus linearibus integerrimis, caule paniculato, pedunculis inferioribus longioribus. (2) patr. et cæt. car. ign.
60. *C. ELEGANS* (Hook. fl. bor. am. 1. p. 297), humilis glaberrima, radice multicipiti, caulibus erectis dichotomis polycephalis, foliis inferioribus spathulatis, superioribus linearibus, involucri cylindræis, achæniis tenuissimè rostratis. — in Amer. boreali ad Assinaboyne river. Affinis *C. nanæ*. An *Barkhausia spec.*?
61. *C. FILIFORMIS* (Viv. fl. libyc. 51. t. 21. f. 1. non Ait.), scapis è collo plurimis, aliis filiformibus nudis 1-cephalis, aliis subfoliosis polycephalis, foliis lineari-lanceolatis ellipticisque integris vel remotè sinuato-dentatis, invol. setuloso, squamis calyculi linearibus laxis. \mathcal{U} in Cyrenicâ. Pappus sessilis scaber.
62. *C. GLANDULOSA* (Bast. in Desv. journ. bot. 1814. p. 17. non Guss.), caule erecto basi sulcato hispido, ramis floralibus striatis subnudis, foliis hispidis runcinatis, involucri piloso-glandulosis. — in montibus Arvernâ propè balnea Montis-Aurei. Herba 2-3-pedalis. Calyculus adpressus persistens squamis margine scariosis. Achænia striata certè erostrâ, undè videtur diversa à *Barkhausia* Reichenb. (v. s. achæn.)
63. *C. HYOSEROIDES* (Sibth. fl. græc. t. 809 ex prod. 2. p. 139), foliis inferioribus obovatis integerrimis, superioribus sagittatis subdentatis, ramis 1-cephalis, involucre piloso. (1) in campis Thraciæ. Cæt. ign.
64. *C. INCANA* (Sibth. fl. græc. t. 82. ex prod. 2. p. 136. non Lapeyr.), caule