

viatus, caule abbreviato, foliis pinnatifidis denticulatis, pedunculis brevibus, aggregatis, nudis, calycibus basi arachnoideo — tomentosis, ceterum glabris. (Wohl eine unvollkommene Pflanze.) Lk.

1. *SONCHUS divaricatus Desf.*

1. *CREPIS foetens*. E. P.

Crep. foetens, ist von der mittel-europäischen durch mehr Rauhigkeit, und gröfsere Blumen verschieden. So auch in Portugal. Lk.

2. *CREPIS coronopifolia*.

270 1. —— *crithmifolia*.

C. crithmifolia scheint neu. *C. foliis inferioribus bipinnatifidis, superioribus pinnatifidis, laciniis elongatis linearibus antrorsum crassioribus, calycibus tomentosulis.* Ausgezeichnet ist die Pflanze durch die langen und schmalen Blattlappen.

Lk.

2. **TOLPIS barbata*. P.

4. —— *Lagopoda* Sm.

T. lagopoda. Gewifs eine neue, sonderbare Art; *caule adulto basi vellere densissimo, ceterum glabro, foliis subsessilibus, oblongis, basi attenuatis, sinuato dentatis, glabris, calycis phyllis lateribus tomentosis, carina glabra*.

2. **HELMINTHIA echoides*. P.

2. **PICRIS hieracioides*. E. P.

2. **LEONTODON Taraxacum*. nE. P.

2. *PICRIDIUM tingitanum*. P.

2. **TRAGOPOGON porrifolium*. E. P.

2. **HEDYPNOIS monspeliensis*. E. P.

2. *ROTHIA cheiranthifolia*. Fl. lus.

P.

280 3. *ANDRYALA coronopifolia*. P.

1. —— *pinnatifida*. M.

2. **THRINCIA pygmaea*.

2. **CICHORIUM divaricatum*. P.

2. **SCOLYMUS maculatus*. P.

3. *CARTHAMUS salicifolius*. Alazor.

COMPOSITAE ACARNANAEE.

2. **CARDUUS Marianus*. P.

2. —— *parviflorus*.

1. —— *clavulatus* Lk.

C. clavulatus, dem *C. crispus* nahe verwandt, aber verschieden. *C. foliis decurrentibus sinuatis spinosis, subtus tomentosis, anthodiis aggregatis, phyllis exterioribus subreflexis spinosis, interioribus lanceolatis, pappi radiis clavatis*. Die inneren Kelchblätter haben eine glänzend, röthlich weisse Farbe; die Blumen selbst sind roth.

3. *CARLINA xeranthemoides* Mass.

290 2. *CYNARA horrida*. Alcauzil. P.

2. **CENTAUREA calcitrapa*. E. P.

2. * —— *Lippii*.

2. * —— *melitensis*. E. P.

5. —— *Teydis*.

C. Teydis Sm. *C. arguta* Nees Horae Ber. p. 116. t. 25. 26. Gehört zur Abtheilung *Rhaponticum*, nehmlich *phylla calycis appendice rotundata, scariosa saepe lacera*. Lk.

4. *CENTAUREA cynaroides*.

C. cynaroides Sm. *Caule simplici, foliis petiolatis, tomentosis, inferioribus runcinatis, superioribus pinnatifidis lobis incisis, summo integro, anthodii phyllis exterioribus scariosis, subrotundis, margine membranaceis, interioribus linearibus, appendice rotundata, intimis linearibus, appendice nulla. Pappus plumosus*. Lk.