

(1—1½" linearis); involuci squamis summis iner-
mibus dilatatis in appendiculam scariosam, margine
erosam, basi purpureoscentem reflexam; flosculis
rubris.

HAB. prope S. Cruz de Tenerife. Link, in
Herb. Buch No. 255.

Species a cl. L. de Buch allata, cui cl. Link
nomen sine descriptione imposuit; postea latuit
in herbario, neque unquam, ut sciam, publicata
sunt. Nemini post Buchium in Nivaria visa ita-
que ulterius quaerenda. — Specimen unicum loco
cito servatur.

74. C. Lippii, L. var.

„Majorera“ (i. e. insulae Fuertaventurae
incola): foliorum radicalium pinnatifidarum lobis
paucioribus rotundatis, obsolete, nec, ut in spe-
ciei typo, profunde dentatis; foliis caulinis prae-
sertim inferioribus solito longioribus.

HAB. prope Puerto Cabras, m. Aprili florens.

Centaurea Lippii vulgaris in Canariis valde
leptophylla eadem est ac C. Broussonetii,
Willd. Herb. No. 16,528.

Alia ejusdem collectionis species ditionis
nostrae sub No. 16,615 nomine C. congestae
Willd. asservata ad C. melitensis L. formam sim-
plicem vel pauciramosam spectat.

75. *Carduus baeocephalus* Webb. var.
Bourgaeanus: involuci squamarum spinis
elongatis, — 4" longis, quae in planta typica
canaria ½ — 1½" longae, tantum dicuntur, flos-
culis rubellis, dum huic albi apice purpurascentes
tribuntur.

Alia discrimina stirpium ceterum conformium
frustra quæsivimus.

HAB. in Handiae montibus! — Ibidem, Plaga
de Barlovento, locis frigidioribus prope rupes
(Bourgeau). Floret Aprili.

C. Bourgaeanus, C. H. Schultz Bip., in Bourg.
Pl. canar. exsicc. No. 454.

De vero *C. baeocephalo* scripsit Webbo in-
ventor Dupréaux: „Espèce très-curieuse. Obser-
vez bien ses écailles sépaloides et vous verrez,
qu'elle diffère de toutes les autres espèces cana-
riennes. Rare; trouvée une seule fois dans les
rochers de la Cuesta de Silva, Nord de Canaria.
— Ce joli chardon est remarquable par la quan-
tité de ses fleurs blanches, ses écailles caly-
cales un peu courbées dans l'état frais et sa bonne
odeur, qui approche de celle du girofle; enfin
son port en général. Je ne l'ai trouvé qu'en
montant la Cuesta de Silva, où il tapisse les inter-
stices des rochers dans les endroits les plus
escarpés.“ — Barranco de la Virgen.

Floruit varietas nostra prope Berolinum in
horto cl. Aemilii Bouché e seminibus cana-
riensis.

76. *Crepis foetida*, L. var.

Gomeraea: pusilla, semipedalis vel humilior,
e basi ramosa; ramis divaricatis arcuatim adscen-
dentibus, denum erectis setosis; foliis infimis lan-
ceolatis sinuato-dentatis, superioribus profundissime
runcinato-pinnatifidis lobis productis dentibusque

acutissimis, parce setosis; pedunculis elongatis
simplicibus vel bifidis subnudis glandulos-pilosis
monocephalis; capituli ligulis inferne apicem ver-
sus rubris.

HAB. in Gomerae montosis supra vicum Her-
migua.

Habitus speciei propriae, quam diu esse credi-
dimus. Cultura per plures annos hucusque con-
stans, nana, dum *Crepidis foetidae* typus per Ni-
variam Canariamque yulgatior in altitudinem bi-
narum pedum excrescere soleat.

77. *Pieridium ligulatum* Vent.

Picridio ligulato facile nil polymorphius in
Canariis. Sicut in stationibus diversissimis vege-
tans, tum Fortunatarum occidentalium scopulos
maritimorum ventis humidis perflatos, tum in insulis
libycae indolis Lanzarote et Fuertaventura, (pro-
babiliter et in proximo Saharae littore, quum et
planta Mogadorensis, sit) deserta campestria saxa-
que aridissima incolit, ita et formas varias per-
multas induere solet. Varietibus quatuor a cl.
C. H. Schultz Bip. egregie expositis addimus
sequentem:

5. var. *grandiflorum* robustum; rosulis
amplis subacaulibus dense foliatis; foliis acutissi-
mis; velut in forma 3 crispa, margine conferte
et inaequaliter sinnato-dentatis; pedunculis abbre-
viatis, sat dense squamatis; anthodiis maximis.

HAB. in Handiae montibus borealibus supra
Cofeito: Floret Aprili, cum Ilicifolio, dum in
Palma varietatem crispam sero autumno adhuc flo-
ridam observavimus.

Varietas *ilicifolia*, hucusque in Lanzarotes jugo
Famara tantum obvia, in Handiae sterilibus de-
missoribus, ubi radices lignosas ipsa planta duplo
et triplo longiores arenae-lapidosae immergit,
forma occurrit, quam facile subvarietatem obtu-
satam dicas quæque ita definiri potest:

Pygmaeum foliis spathulatis, apice rotundato-obtusissimis, margine leviter sinuato-dentatis,
brevissime apiculatis; pedunculis brevissimis sub-
nudis vel parcius squamatis.

Forma 4 pinnatifida *Photographiae canariensis*
crescit et Gomerae in angusta et a mare remota
valle Barranco de la Laja.

78. *Pieridium vulgare*, Desf., Fl. atl.
II, p. 221.

HAB. abunde in herbidis insularum facile omni-
nihil. Gomera, el Risco de Tagamiche. Lanza-
rote prope Guatisa, Bourgeau. Teneriffa, in valle
Tajodio prope S. Cruz.

Floret Januario — Aprilē.

79. *Rhabdotheca divaricata* (Desf.)
Webb. var.

Subnudicaulis: foliis latioribus subintegris
vel margine lobatis neque runcinatis, apice obtu-
satis, caule erecto subsimpli ac subnudo.

HAB. in Fuertaventura prope Puerto-Cabras,
m. Aprili florens.

Transitum quondam inter Rhabdothecam diva-
ricatam, canariensem et Lactucam nudicaulem,
Murr. caboverdicam indicare videtur.