

Obs. 4. Eodem tempore cl. Bischoff mihi nomine *Crepidis rubro-fœtidæ* plantam hybridam communicavit verosimiliter in horto heidelbergensi ortam, ubi ex pluribus observatur annis et facile achæniis propagatur; = *Crepis Bischoffii* C. H. Schultz Bip. herb. Medium tenet inter parentes; flores nunc rubentes, nunc sulphurei, ligulis dorso rubentibus.

2. CREPIS FOETIDA. LINN.

C. annua; capitulis ante anthesin nutantibus; achæniis abrupte in rostrum piliforme, elongatum abeuntibus, periphericis vero suberostribus; foliolis involucri exterioribus lanceolato-linearibus, subacuminatis, pilosis, arrectis; floribus aureis.

Variat: caule 1-polycephalo, erecto, diffuso, prostrato, foliis subintegris, denticulatis, runcinato-pinnatifidis, imo laceris, pubescenti-hirto-hispidis, pilis apice sæpius clavato-glandulosis.

Erigeron tertium. *Dodon. pempt.*, p. 641 cum icone formæ diffusæ, foliis pinnatifidis.

Senecio hirsutus. *C. B., Pin.*, p. 131.

Jacobæa sylvatica tomentosa *Cichorii sylvestris folio*. *Moris. Hist.*, sect. 7, p. 109, tab. 17, fig. 10. — Copia icon. *Dodon.*

Crepis fœtida. *Linn., Sp. pl.*, ed. 1, p. 807. — *Engl. bot.*, tab. 406.

Crepis fœtens. *Link, in Buch Canar.*, p. 147 et 164 (a formis Europæ mediæ differt uti specimina lusitanica capitulis majoribus et insuper magis aspera Lk.).

Synonyma cætera, alio loco enumeranda, taceam et tantum *Candolleana* adducam.

Barkhausia graveolens. *Link, Enum. H. berol.*, vol. 2, p. 290. — *DC., Pr.*, vol. 7, p. 158.

Barkhausia Candollei. *Spr.* — *DC., l. c.* sec. *Spr.*, *Syst. veg. cur. post.*, p. 304, est *Crepis glandulosa* *Gussone!* quæ a formis canariensibus non differt. Cf. cæterum supra observ. 3.

Barkhausia glandulosa. *Presl.* — *DC., l. c.*

Barkhausia fœtida. *DC., l. c.* et forsitan adhuc tres species sequentes n. 37-39.

Barkhausia pinguis. *Rchb.* — *DC., Pr.*, vol. 7, p. 159.

Barkhausia prostrata. *Dumort.* — *DC., l. c.*

HAB. *Martinez, in Barranco Puerto Orotava.* — 1200 ped. sec. *Buch, l. c.*; in et saxetis glareosis convallium prope castellum *Paso alto* ad oppidum Sanctam Crucem ins. *Teneriffæ*, in glareosis convallium ins. *Palmæ* et in *Canariâ*: *Webb!*

Obs. Specimina canariensia pl. spithamea-pedalia, valde hirsuta, pilis plerisque imprimis ad plantæ partem superiorem glanduliferis, foliis pl. pinnatipartito-laceris et hinc formæ adnumeranda glandulosæ.

DISTRIB. GEOGR. *Crepis fœtida* civis est Europæ mediæ et australis præcipue orientalis Caucasum et ad mare Caspium usque se extendens. Apud nos in Palatinatu a Junio in autumnum usque, præcipue mense Julio floret ad vias in sterilibus, præcipue vero in agris *Medicaginis sativæ*. Infuso ejus ex anno 1839 contra affectiones hystericas prosperrime utor.

Formæ sequentes distinguendæ:



A. *Orientalis*. Procera, capitula majora, breviora, involucri squamæ latiores pilis simplicibus crassis hirsutæ, achænia non tam gracilia involucri subæquantia pl. breviora, raro longiora. — *Crepis rhœadifolia* M. B., Fl. taur. Caucas., n. 1625. — Koch! Syn., ed. 2, p. 500. — Ipse M. B. in suppl. dicit : ... Dubium intercedit, an sit mera *Cr. fœtidæ* varietas : foliis magis dissectis.

Bavaria, prope Neoburgum ad Danubium : a Frœlich!; Bohemia pr. Muenchengraetz : Sekera! Austria pr. Baden : à Frœlich! Türkenschanze pr. Vindobonum : Schnitzlein!; Bannatus : Rochel! Wierzbicki! (equidem forma hirsuta, glabrescens et sabulosa : foliis linearibus, inferioribus dentatis).

B. *Occidentalis*. Gracilior, capitula magis elongata, involucri squamæ angustiores, achænia graciliora involucri superantia.

a. *Borealis*. Pili breviores, simplices vel + — glanduliferis intermixti. Hæc forma in Germania præcipue media et australi abundans, mihi *Crepidis fœtidæ* typus est. In Palatinatu, præcipue Rhenum versus, tam copiosa est ut agros viderim, a pappo nitentes, veluti nive oblectos. Eandem formam habeo : Gættingen : Schiede!; Tyrolis : a Frœlich! Facchini!; Stuttgart : Lechler!

Gallia e. g. prope Parisios : Kralik!

Italia super. : Cristof. et Jan! exsicc. gen. 667, spec. 4; Pedemont. pr. Chatillon : W. Sonder!; Abruzzo : Guss.!

b. *Australis*. Pili elongati in plantæ parte superiore pl. glanduliferi.

Sicilia : Gussone!; Græcia ad Lebadiam : Fraas! Argolide : à Spruner!; Gallia austr. e. g. prope Perpignan : herb. Frœlich! Huc etiam specimina spectant canariensia.

Formæ pilis simplicibus sensim transeunt in formas pilis glanduliferis + — munitas; perinde formæ pilis brevibus junguntur formis innumeris cum formis pilis elongatis instructis. Frustra etiam limites quæsi formæ orientales inter et occidentales.

In hortis botanicis nomine *Crepidis*, *Barkhausiæ* vel *Anisoderidis fœtidæ*, *rhœadifoliæ* et aliis sæpius colitur.

3. CREPIS JUVENALIS. F. G. SCHULTZ.

C. annua; capitulis semper erectis demum cylindræis; achæniis sensim in rostrum filiforme abeuntibus elongatum, periphericis vero suberostibus; foliolis involucri externis anguste linearibus, acutis, laxiusculis, pilis pl. glanduliferis munitis. (Herba palmaris, gracilis, tenera, multicaulis, ramosa, ramis elongatis 1-cephalis fistulosis, subhirta.)

Barkhausia juvenalis. Delile! Ind. sem. H. monsp., 1836, p. 23, et Ann. sc. nat., 1837; Bot., p. 286. — DC., Pr., vol. 7, p. 159.

Crepis juvenalis. F.-G. Schultz, in Flora bot. Zeit., 1840, p. 619.

HAB. In arvis aridis Teneriffæ prope oppidulum Guimar cum *Hypochæride Balbisii*, die 16^o mens. decembr. E. Bourgeau!

DISTRIB. GEOGR. Prope Monspelium ad portum juvenalem, ubi ad fluv. Lez lana è