

Caule elato, fistuloso, glanduloso, superne ramosissimo; foliis glabris, inferioribus runcinatim lyrato-pinnatipartitis, in petiolum basi sensim dilatatum abeuntibus, mediis runcinatis vel subintegris, basi sessili late et obtuse auriculatis, summis lanceolatis, integris; capitulis cylindricis, 8—10 floris; involucri glabri phyllis externis lanceolatis, acuminatis, internis triplo longioribus, obtusis; ligulis flavis; acheniis elliptico-linearibus, nigris, minute rugulosis, apice asperis, rostro 2—3 plo brevioribus, albo terminatis.

In collibus dumosis pr. monasterium Meteora supra Kalabaka Thessaliae (Haussk.). — Jun. Jul. ☉ N. v.

### 93. *Crepis* L. gen. n. 914.

#### Dispositio specierum:

1. Sectio. *Eucrepis* Bois. fl. or. III. p. 831. — Achenia exalata, apice plus minus attenuata, sed non rostrata.

a. Estolonosa; non tuberifera.

α. Perennes.

× Caulis foliatus (foliis interdum minimis), normaliter pleiocephalus.

○ Involucri phylla eglandulosa, praeter indumentum farinosum, dorso pilis crebris longis nigricantibus ciliata.

1. *C. geracioides* Haussk.

○○ Involucri phylla plus minus farinoso-tomentella, interdum glandulosa, pilis longis nigricantibus nullis.

. Folia radicalia obovato-oblonga, oblonga vel ovato-lanceolata, varie partita vel dentata.

; Rhizoma fusiforme.

, Flosculi lutei.

— Folia glandulosa.

2. *C. Baldaccii* Hal.

3. *C. Raulini* Bois.

:= Folia eglandulosa.

— Achenia scabra; folia tenera, dentata.

4. *C. auriculaefolia* Sieb.

= Achenia laevia; folia radicalia runcinata; plantae omnino eglandulosae.

5. *C. turcica* Deg. et Bald.

6. *C. divaricata* Bois. et Heldr.

7. *C. Sibthorpiana* Bois. et Heldr.

„ Flosculi rosei.

8. *C. incana* S. et S.

; Rhizoma praemorsum, longe et dense fibrosum.

, Involucrum pedunculisque glandulosum.

9. *C. Fraasii* Schultz.

10. *C. smyrnaea* DC.

„ Involucrum pedunculisque eglandulosum.

11. *C. Reuteriana* Bois.

.. Folia radicalia linearia, graminea, integra.

12. *C. crocifolia* Bois. et Heldr.

×× Caulis nanus, aphyllus vel subnudus, scapiformis, mono vel dicephalus.

13. *C. bithynica* Bois.

14. *C. Columnae* Ten.

priam (*C. corcyrensis*) sistet. — Huc forsā spectat *C. purpurea* Gelmi in bull. soc. bot. ital. 1889 p. 450 e Corcyra pr. Signes.

β. Ligulae luteae.

22. *C. foetida* L. sp. p. 807; Ch. et B. fl. pelop. p. 55; Weiss in z. b. G. 1869 p. 45; Bois. fl. or. III. p. 851; Heldr. fl. cephal. p. 50, Fl. Aegina p. 307, chlor. Thera p. 16; Form. in D. bot. Monat. 1890 p. 14, in Ver. Brünn 1895 p. 25; Hal. Beitr. fl. Achaia p. 25. — *Barkhausia foetida* DC. fl. fr. IV. p. 42; Raul. cret. p. 798. — Icon: Rchb. t. 83.

Pubescens vel hirsuta, saepe glandulosa; caulibus solitariis, erectis vel numerosis, adscendentibus, simplicibus vel ramosis; foliis inferioribus in petiolum attenuatis, runcinato-pinnatifidis, interdum sublyratis, rarius sinuato vel repando-dentatis, caulinis auriculato-amplexicaulibus, incisedentatis, summis integris; capitulis solitariis cymosisve, majusculis, ante anthesin cernuis; involucri cano-tomentello et plus minus longe et crebre setuloso, simulque saepissime glanduloso, phyllis lanceolatis, adpressis, internis triplo longioribus, demum ad carinam induratis; acheniis subtiliter striatis, externis breviter attenuatis, ceteris in rostrum eis longius abeuntibus. — Stirps valde polymorpha.

α. **typica.** — Annuā, caule erecto, solitario, infra medium vel superne ramoso; involucri cano-tomentello, pilisque glandulosis brevibus obsito. — Exsicc.: N. v.

β. **interrupta** S. et S. pr. fl. gr. II. p. 137, Fl. gr. IX. p. 2 t. 803 pro sp. — *C. glandulosa v. interrupta* Haussk. symb. p. 136. — *C. glandulosa v. acutiloba* Haussk. l. c. p. 137 (f. foliis profunde pinnatifidis, laciniis angustis, longe acutatis). — *C. foetida v. lago-serioides*, Bald. viagg. Creta p. 72. — Annuā, caulibus solitariis vel pluribus, adscendentibus, humilibus, a collo ramosis; involucri cano-tomentello pilisque longioribus et brevioribus, glandulosis obsito. — Exsicc.: Orph. fl. gr. n. 342; Sint. et Bornm. it. turc. n. 1339; Bald. it. cret. n. 79.

γ. **glandulosa** Guss. ind. sem. hort. Bocc. 1825 p. 4, pro sp.; Bisch. Beitr. p. 252. — *C. foetida v. rhoeadifolia* Bois. fl. or. III. p. 851, saltem quoad loca graeca; non *Barkhausia rhoeadifolia* M. a. B. fl. taur. cauc. II. p. 259, quae involucri setis longis rigidis, plerisque eglandulosis hispido differt. — *C. glandulosa v. simplex* Haussk. symb. p. 136; Form. in Ver. Brünn 1897 p. 30. — Annuā, caule erecto, solitario, infra medium vel superne ramoso; involucri pilis longis flavescentibus glanduliferis dense hispido. — Exsicc.: Heldr. herb. norm. n. 310; Dörf. fl. aeg. n. 17.

δ. **radicata** S. et S. pr. II. p. 136, Fl. gr. VIII. p. 74 t. 800. — *C. foetida v. maritima* Bois. fl. or. III. p. 851. — *C. glandulosa v. maritima* Haussk. symb. p. 137. — Perennans, caulibus humilibus, adscendentibus, parce ramosis vel monocephalis; foliis glabres-