

dedit cl. Steven, vix nisi partium floralium magnitudine majori est distinguenda.

196. L. hastilis L.

Ex toto glaberrimam legi in Transsilvaniae valle subalpina Hodák inter et Remete, in m. Kereszthegy.

197. Scorzonera taurica M. B.

In campestribus elatioribus („Heuwiesen“) pr. Klausenburg leg. Wolff a. 1854.

198. Podospermum canum C. A. Mey.

In campis pr. Karlsburg; in reg. Mezőség pr. Szék frequens.

199. Crepis sibirica L.

In Transsilvaniae subalpinis pr. Rodna detexit cl. Dr. Joo!

200. C. Fussii Kováts! in sched. 1843. *Hieracium transsilvanicum* Heuff.! Enum. pl. banat. Temes. p. 115 *H. eriophyllum* Schur Sertum fl. Transsilv. ? (solum nomen). *H. arcticum* Schur in Verhandl. n. Mittheil. d. siebenb. Vereins f. Naturw. X. (1859) p. 126? *H. oblongifolium* Schur! pl. Transsilv. exsicc.

Rhizoma horizontale, praemorsum, dense fibrosum. Folia basilaria 1 — 2 l. rosulata; omnia oblonga, elliptica vel spatulata apice subacutata, in petiolum lamina nunc aequi-longum nunc breviorem sensim sensimque attenuata, integerima vel remotissime obsoleteque repandula, vel obtusissime remote repando-dentata. Caulis, vel quandoque plures eadem ex foliorum rosula, erectus, semi—sesquipedalis, folia fert 1 ad 3, semper basi attenuata, basilaribus conformia, tamen brevius petiolata l. omnino sessilia. Inflorescentia subcymoso-paniculata, vel simplicissima, nunc valde luxurians, nunc pauciflora; — immo monocephala in speciminibus parvis. Periclinia cylindracea, gracilia, laete virentia, subglabra, eglan-

dulosa. — Herbae pars inferior i. e. folia subtus marginibusque, praesertim vero petioli pilis longis dense villosi. Villus plerumque rufescens.

Hab. in Transsilvaniae carpaticae regione Fagi atque abietina; e. g. in alpibus Rodnensis; in montis Kereszthegy versus Moldaviam muscosis humidis defloratam legi exeunte Septembri 1858.

Ab *Hieracio vulgato* Fries, quocum facile confunditur, distinctissima.

201. *Crepis praemorsa* Tausch. — Pr. pag. Gáncs Transsilvaniae septemtrionalis totam glaberrimam legit cl. Czetz!

202. *Hieracium Pavichii* Heuff. ! *H. Fussianum* Schur !

Hab. in Transsilvaniae montibus schistosis pr. Hermannstadt.

H. piloselloides Vill. proximum; sed caulis, magis etiam foliosus, a medio plerumque, vel infra medium jam in ramos divisus, inflorescentia laxior, magis expansa. Planta semper estolonifera.

203. *H. murorum* L.

In Transsilvaniae centralis territor. Mezöség rarissimum, solumque in silva pr. Mohaj a. 1858 mihi obvium.

204. *H. boreale* Fr.

In territor. Mezöség silvis haud rarum.

205. *H. umbellatum* L.

In dit. Mezöség frequens.

206. *Phyteuma spicatum* Baumg. Enum. stirp. Transsilv.

Pr. Klausenburg frequens; in dit. Mezöség silvaticis versus Szék etc.

In planta ex variis Transsilvaniae locis semper calyces 4-fidos, corollas 4-partitas, stamina 4 vidi.