

*Hieracium Taygeteum* B. & H. in saxosis jugi Zygos, Oxya, supra Chaliki.

**H. florentinum** All. (*H. piloselloides* Vill.) in jugo Zygos substratu silicico-serpentino.

*H. praealtum* Vill. (*H. Magyaricum*  $\beta$ . *Laconicum* N. Pet. 576) in nemorosis pr. mon. Korona, in oropedio Neuropolis, in m. Pentelico.

*H. Sabinum* Seb. & M. in nemorosis quercinis oropedii Neuropolis; in jugo Zygos.

*H. Heldreichianum* N. & P. p. 408 in nemorosis oropedii Neuropolis, m. Karava, in jugo Zygos.

**H. Heldreichianum**  $\times$  **praealtum** in oropedio Neuropolis sparsim inter parentes. — Eine wegen der sehr abweichenden Merkmale des *H. Heldreichianum* leicht kenntliche Hybride.

*H. macranthum* Ten. in nemorosis m. Peltii; in oropedio Neuropolis.

**Crepis Smyrnaea** DC. in silvis deustis m. Pentelici. Civis flor. europ. nova.

*C. Fraasii* Sch. Bip. in Flora 1842 p. 173, *C. Sieberi* Boiss. Diagn. I. 11. 53 (1849) in silvaticis m. Pentelici, in graminosis m. Hymetti, in distr. Laurion pr. Kamariza.

**C. geracioides** Hskn. sp. n. Rhizoma obliquum praemorsum pollicare fibrillosum pluriceps collo glabrum; caulis fistulosus pedalis inferne 1—2-foliatus rubescens leviter sulcatus pilis crispulis deorsum directis sparse obsitus, a medio vel infra idem ramis paucis 1—3 strictis valde elongatis leviter striatis glabris nudis monocephalis munitus; folia obscure viridia subtus pallida, ad nervum medium tantum pilosa, basilaria breviter petiolata 8 : 4 cm longa lata in parte inferiore breviter irregulariterque pinnatipartita, segmentis inferioribus parvis oblongis obtusiusculis, superioribus binis dimidio majoribus subrecurvis obtusis vel acutis irregulariter remoteque denticulatis, lobo terminali triangulari-lanceolato apice abrupte breviterque acuminato 4—5 cm longo et ad basin subaequilato in auriculas divergentes lobo latiores diviso, caeterum irregulariter sinuato-dentato dentibus obtusiusculis porrectis, folium caulinum ad ramificationis basin ovato-lanceolatum cordato-semiamplexicaule integrum 5 : 2 cm longum latum dentibus repandis acutis porrectis brevibus munitum, ad basin denticulato-auriculatum, in apicem integerrimum triangulari-lanceolatum acutum angustatum, folia summa bracteaeformia diminuta, e basi dilatata sensim lineari-lanceolata, integerrima; pedunculi elongati fistulosi teretiusculi apicem versus sensim clavato-incrassati infra capitulum subconstricti, nudi; capitula 12 mm longa erecta, involucri nigricantis phylla externa triangulari-lanceolata

farinoso-canescens et ad nervum medium pilis nigricantibus basi dilatatis longiuscule ciliata, interiora lineari-lanceolata subobtusae pubescentia; receptaculum areolatum nudum; ligulae flavae concolores 10 : 2 mm longae latae; styli lutei, achaenia brunnea conformia compresso-subprismatica tenuiter 30-striata apice non attenuata, basi truncata, 5½ mm longa, pappus niveus fragilis tenuiter pilosus 8 mm longus involucrum superans. — Hab. in subhumidis jugi Zygos substratu silicico-serpentino. — Secundum Flor. or. in sect. *Eucrepis Praemorsae Elatae* prope *C. willemetioidem* Boiss. collocanda.

*Crepis Columnae* Froel. in alpinis m. Karava, in jugo Zygos.

**C. pulchra** L. in arvis neglectis pr. Pharsalum. — **Var. β. adenoclada** Hskn., caulis scabriusculus inferne crispule-puberulus, caeterum ad inflorescentiam usque dense glandulosus, pedunculi in parte superiore tantum glabri; folia basilaria subintegra ex apice dilatato valde rotundato sensim in petiolum angustata, in parte media inferiore leviter repanda, utrinque glanduloso-pilosa; achaenia interiora scabriuscula nec laevia; hab. in dumetis saxosis supra Kalabaka Th. pr. mon. Meteora. — Eadem varietatem in Syria bor. pr. Aintab et pr. Biredjik legi.

*C. bulbosa* Tsch. in maritimis Att. ad Phalerum, Laurion, Naupliam, Korinthum.

*C. rubra* L. in m. Palamidi supra Naupliam, in Th. pr. Pharsalum, Aivali, Orman Magula.

*C. glandulosa* Guss. ind. sem. h. b. (1825) in Att. et Th. collibus et agris frequ. — Multum variat: a) *simplex*, caulis simplex erectus strictus crassiusculus in parte inferiore saepe rubicundo dense pilis crispulis longis albidis, in parte superiore praeterea pilis glanduliferis brevioribus intermixtis obsitus, ramulis abbreviatis inflorescentiam confertam subcorymbosam formantibus, folia oblongo-lanceolata repandodentata vel ad basin incisa, involucri cani phylla pilis glanduliferis longioribus et brevioribus dense obsita; hab. ad vias, in agris inter Athenas et Phalerum. Eadem forma caule mono- vel oligocephalo, foliis integris breviter denticulatis reperitur. — b) *interrupta* S. S. (pr. sp.), caules solitarii vel plures arcuato-adscendentes tenuiores humiles, a collo ramosi, exasperati sparse glanduloso-pilosi; folia pinnatifida v. runcinato-pinnatifida lobo terminali latiore triangulari; involucri phylla pilis majoribus et minoribus glanduliferis obsita; hab. in collibus aridis Lycabetti, ad akropolin Athenarum. — c) *eglandulosa* (Barkh. *Zacynthia Marg. & Reut.*, *B. Byzantina* DC.), involucri phylla pilis longis hispidis eglandulosis dense obsita; hab. in herbis m. Palamidi supra Naupliam. Formam involuero subglanduloso in paenins. Methana legi. —