
 PHYTOGRAPHIE.

NOTE sur quelques espèces nouvelles à ajouter à la Flore de France ; adressée au Rédacteur par T. BASTARD , Directeur du jardin Botanique d'Angers.

CREPIS GLANDULOSA.

C. foliis hispidis runcinatis ; involucris piloso-glandulosis ; caule erecto basi sulcato hispido ; ramis floralibus striatis subundis.

Cette espèce est très-facile à distinguer de toutes ses congénères par les poils glanduleux (*pili capitati*) qui couvrent l'involucre ; ses fleurs sont de la grandeur de celles du *Crepis tectorum* ; l'involucre extérieur est redressé, persistant, à folioles membraneuses sur les bords ; les côtés des semences, qui sont finement striées, paraissent chagrinés : la plante s'élève de deux à trois pieds ; elle fleurit en juin et juillet.

Je l'ai recueillie dans la vallée du Mont-d'Or, un peu au dessous du village des Bains (1).

SAXIFRAGA PENDULIFLORA.

S. foliis inferioribus reniformibus 7-9 lobatis , caulinis palmato-incisis , 5-7 lobatis ; floribus cernuis ; radice repente lignosa stolonifera.

Il paraît que cette plante, qui a été connue des Botanistes, n'avait jamais été bien examinée, puisqu'ils l'ont rapportée comme variété, à la *Saxifraga granulata*. Elle en est bien distincte ; 1°. par sa racine qui est formée de souches ligneuses,

(1) Je ferai parvenir des graines de cette plante aux jardins de Paris, de Montpellier, etc., afin qu'on puisse la constater.